

502702
G211
K
KRITISCHE REVISION

DER

INSEKTENFAUNE

DEUTSCHLANDS

NACH DEM SYSTEM BEARBEITET

VON

Dr. GEORG WOLFG. FRANZ PANZER.


I — XCVI. HEFT.

I. BAENDCHEN.


N Ü R N B E R G,

in der Felfseckerschen Buchhandlung


1805.



Chas. W. Richmond.
Apr. 11, 1904.



V o r b e r i c h t.



O bgleich die deutsche Insektenfaune, seit ihrer Gründung, mit und bey der Angabe, der von ihr vorgestellten und genannten Insektenarten, sich mit bekannter, und vielleicht nur selten verfehlter Genauigkeit, an das schon vor ihrer Gründung, von den meisten Entomologen angenommene System anzuschließen erlauben konnte, so war sie doch hiebey eben so wohl, als

V o r b e r i c h t.

dasselbe selbst, der Natur der Sache nach, einer bis izt noch fortdauernden und vielleicht nie sich endenden Umgestaltung, und durch die neuern Entdeckungen, und wiederholten genauern Beobachtungen nothwendig gewordenen Abänderung ihrer nomenclatorischen Angaben, und systematischen Befolgungen unterworfen. In so ferne es nur immer möglich war, sich von den genauern Bestimmungen, welche sowohl in den neuern Fabrizzischen Werken, als in denen, anderer vorzüglicher Entomologen an die Hand gegeben wurden, leiten zu lassen, als auch selbst dadurch, was aus eigenen wiederholten, und genauer als vorhin angestellten Untersuchungen resultirte,

habe

Vorbericht.

habe ich als Herausgeber, so weit es meine übrigen Berufsverhältnisse verstatteten, nicht nur mit besonderer Vorliebe, sondern auch mit möglichster Sorgfalt, das wohl grösstentheils benützt und angenommen, was meinem Werke einen höhern Grad von Bestimmtheit und Zuverlässigkeit bey der Angabe, der darinn vorgestellten Gegenstände gewähren konnte. Es war dieses mein Bestreben stets, und wenn ich auch nicht der Meinung, oder den vielleicht strengen Wünschen aller genügen konnte, so lag wohl der Grund vorzüglich darinn, daß ich der Fabrizischen Nomenclatur am meisten getreu geblieben, und nicht solche da schon hintansezte, wo ich ahnden konnte, daß der ehrwürdige Fabrizious entweder

V o r b e r i c h t.

der von selbst diesen oder ienen Gegenstand, eben also beurtheilen und bestimmen, oder wenigstens, wie die Folge auch wirklich lehrte — diese andere, vielleicht besser gewählte Bestimmung annehmlich finden dürfte. Konnte indessen manche richtigere und zweckmäsigere nachher aufgefunden Bestimmung, während dem Vorrücken der einzelnen Hefte auf die vorhergehenden nicht mehr zurückwürken, so suchte ich solche doch bey der zweiten Auflage der frühern Hefte anwendbar zu machen. Da jedoch diese zweite Auflage nur sehr langsam vorrücken kan, und selbst die ersten Hefte dieser selbst, so wie die spätern der erstern, so manche Vorstellungen enthalten, welche

eine

Vorbericht.

eine seitdem nothwendig gewordene Berichtigung ihrer nomenclatorischen Angaben heischen, auch manche Freunde und Besitzer der deutschen Insektenfaune sehr wünschten, mit solchen früher bekannt zu werden, als ausserdem kaum etwa möglich war, so konnte ich wohl nicht, mich gegenwärtig schon, während dem ununterbrochenen Fortschreiten derselben, einer kritischen Revision der abgebildeten und solche heischenden überheben, zumal in der Voraussetzung, hiedurch die Brauchbarkeit derselben gewinnen zu lassen. Ob ich gleich bey der Berichtigung mancher nomenclatorischen Angaben zuvörderst von den neuesten Fabrizeschen,

Vorbericht.

schen Werken ausgieng, in so ferne in solchen auf die von mir abgebildeten Gegenstände, mit Zuverlässigkeit hingewiesen worden, so hielt ich es doch auch für Pflicht, auch auf andere entomologische Werke, in welchen auch diejenigen Arten, die ich in der deutschen Insektenfauna vorstellig gemacht habe, noch näher und noch richtiger beistimmt worden sind, die gebührende Rücksicht zu nehmen. Eben so wohl habe ich dankbar diejenigen Erinnerungen, Nachweisungen und Kritiken zu benützen keinen Anstand nehmen können, welche in den mir bekannten vorzüglichern kritischen Zeitschriften, unter welchen ich die meist sehr pertinenten Erinnerungen

gen

Vorbericht.

gen des achtungswürdigen Recensenten in der Allgem. Lit. Zeit. nennen kan, mir vorgekommen sind. Doch würde ich vielleicht kaum das haben leisten können, was ich glaube wirklich geleistet zu haben, wenn nicht einer der scharfsinnigsten, und mit allem Rechte hochgeachteten deutschen Entomologen, Herr D. Illiger in Braunschweig, die Güte und Freundschaft für mich gehabt hätte, die von mir ihm vorgelegten Fragen, Anstände und Zweifel, über mehrere in der deutschen Insektenfaune abgebildeten Arten, zu beantworten, und zu beseitigen. Herr D. Illiger muß unstreitig hiebey darum als kompetenter Richter anerkannt werden, weil er nur
allein

V o r b e r i c h t.

allein in Stand seyn konnte, mir über mehrere Insektenarten, die mir mein verehrungswürdiger Freund, Herr Hofrath Dr. Hellwig in Braunschweig, aus seinem reichen Cabinete zur Bekanntmachung erlaubte, zumal über diejenigen, welche in der Insektenfaune bisher nur allein, ohne alle Concurrrenz zur Sprache gebracht worden, die ich nun nimmer selbst vergleichen konnte, eine in aller Hinsicht genügende Auskunft zu geben. Mit dem verbindlichsten Dank erkenne ich hier öffentlich diese vorzügliche Beyhülfe, von der ich auch, wie durchaus ersichtlich ist, mit der größten Genauigkeit, einen solchen Gebrauch gemacht habe, der iedem, der für diese

Gegen-

Vorbericht.

Gegenstände einiges Interesse hat, gewis nicht anders, als höchst willkommen seyn wird.

Doch glaubte ich, daß es auch mir erlaubt seyn würde, über dieienigen Arten, welche ich etwas anderst, als andere, nicht minder darum von mir geschätzte Entomologen, beobachtet, meine Meinung zu sagen: man wird ausserdem auch bemerken, daß ich ieder gerechten Kritik, sie komme her, von wem sie wolle, offen und gerade die ihr gebührende Gerechtigkeit wiederfahren liefs, wenn ich gleich im Gegentheil manche unstatthafte Zurechtweisung von mir ablehnen mußte: ein Umstand, den ich mir eben so zuständig

stets

Vorbericht.

stets erachten werde, als ich andern die unbedingte Freyheit zugestehe, mir es geradezu anzuzeigen, wenn ich etwa einer Bestimmung gehuldigt hätte, die sich mit der naturhistorischen Wahrheit und Erfahrung, nicht vertragen sollte. Ausserdem wird man noch finden, daß ich in dieser kritischen Revision, nur alleine diejenigen, von mir in der deutschen Insektenfaune vorgestellten Arten genannt habe, bey welcher ich eine Berichtigung für nöthig erachtete, dagegen alle andere, für berichtigt angenommen, übergangen habe. Möglich ist es indessen doch, daß unter solchen von mir nicht ausdrücklich genannten, noch manche sind, die einer nähern

V o r b e r i c h t.

nähern Erläuterung und Berichtigung bedürfen: Mit verbindlichem Danke würde ich es erkennen, wenn diejenigen einsichtsvollen Entomologen, welche dieses erste Bändchen, etwa zeitig in den gelehrten Zeitschriften beurtheilen werden, mich selbst hierauf aufmerksam zu machen die Güte haben wollten, um bey dem Schlusse des ganzen, diese, und noch einige andere Arten, die während dem Abdruck dieses ersten Bändchens mir einer nähern Berichtigung unterwürffig schienen, anzufügen. In den beyden folgenden Bändchen, werde ich die übrigen in der Insektenfaune vorgestellten Arten, ie nachdem solche einer kritischen Revi-

sion

V o r b e r i c h t.

sion heischen, nach dem System, anzuzeigen und vorzulegen, zugleich auch das nöthige Register über diese 96 Hefte, anzuschließen, gewis nicht verfehlen.

Geschrieben Nürnberg den 11. April

1 8 0 5.

Dr. Panzer.

I. ELEUTHERATA FABRIC.



CLASSIS I.
ELEUTHERATA FABRIC.

GEOTRUPES NASICORNIS Faun. Inf. ger. XXVIII.
2. ed. II.

Geotrupes nasicornis, Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 41. p. 13.

Eine weniger bekannte Abbildung dieses Käfers, kommt in der vielleicht eben so wenig allgemein bekannten kleinen Schrift: *Observationes circa humani corporis Teredinem, a Ioh. Cosmo Bonomo ad Francisc. Redum Sc. italico sermone 1687 conscriptae et Florentiae typis impressae, nunc vero latinitate donatae a Iosepho Lanzono. 4. Liburni 1687*, auf der hiezu gehörigen Kupfertafel (welche unten mit Dec. II. bezeichnet ist) bey Fig. 8. vor. Auf pag. 8. wird desselben Käfers, aber zugleich mit Begehung eines sehr starken Irrthums also gedacht: *VII. Figura exprimitur vermis sive caries* (die Larve dieses Geotr. nasic. F.) *quae postea in Scarab. pillularium* (den Ateuchus facer) *et in scarabaeum stercorarium* (diesen Geotrup. nasic. F.) *transformatur. Quemadmodum figura VIII. ipse stercorarius repraesentatur Scarabaeus* (sehr kenntlich dieser G. nasic.) *ac Fig. IX. pillularius* (eben so kenntlich der Ateuchus facer) *itidem insculpi- tur scarabaeus,*

A

SCAR

SCARABAEVS QVADRIDENS Fn. Inf. germ. XIII. 1.

Scarabaeus Aeneas. Panzer Beytr. p. 34. tab. 5.

Fig. 1 — 4.

Scarabaeus unicornu, Schrank. Naturf. XXIV.

n. 2. p. 61.

Scarabaeus quadridens. Fabric. Syst. Eleuth. I.

n. 6. p. 23.

Herr Prof. Fabricius führt nicht nur die in meinen Beyträgen etc. a. a. O. befindliche Figur dieses Käfers bey seinem *Scarabaeus quadridens* l. c. an, er erhielt auch ein Exemplar dieses nehmlichen Käfers von mir, und äussert sich darauf sehr bestimmt, *dass derselbe sein Scarabaeus quadridens wirklich seye!!* Vergleiche hierüber Illiger Mag. I. p. 312, wofelbst behauptet wird, dass dieser *S. quadridens* Fn. und *S. Aeneas*, nicht der *S. quadridens* Fabric. sey: wie auch A. L. Z. 1803. Nr. 353. p. 620.

SCARABAEVS STERCORARIVS. Faun. Inf. germ. XLIX. 1.

Sturm. ent. Handb. I. n. 57. p. 63. Tab. II.

Fig. A — S.

Walkenaer Faun. parif. l. n. 2. p. 3. Tab. II.

fig. 2. A—Q. (Ein blofser Nachstich der vorhergehenden Zeichnungen.)

SCARABAEVS SYLVATICVS, Fn, Inf, germ, XLIX. 3.

Sca-

Scarabaeus sylvaticus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 11. p. 25.

Illiger Kugelanns Käfer Preussens I. n. 3. p. 9.

SCARABAEUS VERNALIS Fn. Inf. germ. XLIX. 2.

Schäffer Sc. Inf. ratisb. tab. 222. fig. 1. ge-
hört mit mehr Recht hieher, als zu dem *Sc.*
sylvatic. F.

SCARABAEUS TESTACEUS Fn. inf. germ. XXVIII. 5.

Ist nichts anders als eine *Abänderung* des weib-
lichen *Scarab. mobilicorn. Fab.* Ich bitte hiebey
nachzulesen, was ich in meinen *Beyträgen &c.* S. 82.
u. f., so wohl über diesen *S. testaceus*, als *licht-*
braune Abänderung, als auch über die generische
Dignität des *Sc. mobilicornis Fab.* überhaupt, er-
wähnt habe. Hieher gehört auch:

Schäffer. Icon. Insect. ratisb. tab. 151. fig. 4.
Fem. variet.

Panzer systemat. Nomenclat. d. Schöff. Inf.
n. 4. p. 143.

Vergl. *Allgem. Lit. Zeit.* 1797. Nr. 143. p. 324.

SCARABAEUS LUNARIS. Fn. inf. germ. XLIX. 4;

Copris lunaris. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 29.
p. 36.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 1. p. 39.

Sturm ent. Handb. I. n. 74. p. 87. tab. IV.
fig. A—R.

SCARABAEUS EMARGINATUS. Fn. inf. germ.
XLIX. 5.

Copris emarginata. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 30. p. 37.

Gewis nur eine zufällige *Abänderung* des vorhergehenden. Ich finde sie beide jährlich in Gesellschaft an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsorte beyeinander. — Schäff. I. Inf. ratisb. tab. 63. fig. 2. stellt das *Weibchen* der *C. lunaris* vor.

SCARABAEVS VACCA. Fn. inf. germ. XII. 4. Femina.

Copris Vacca. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 70. p. 45.

Schäffer Ic. Inf. ratisb. tab. 73. fig. 2. 3.

Illiger Kug. K. Pr. I. n. 3. p. 40.

Panzer Beytr. p. 101. tab. 11. fig. 1. 2. 3. 4.

SCARABAEVS MEDIUS. Fn. Inf. ger. XXXVII. 4.

Copris media. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 71. p. 46.

Creutzer Versuch. n. 19. p. 62.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 4. p. 41.

SCARABAEVS CAPRA. Fn. inf. germ. XLIX. 7.

Copris capra. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 72. p. 46.

Copris Taurus var. β . Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 8. p. 44.

Die Kürze und Geradheit der beiden hörnerartigen spitzigen Fortsätze des Kopfschildes hat

ver-

verschiedene einsichtsvolle Entomologen verleitet; hierin nur einen Uebergang der *Copr. Taurus* zu dieser zu bemerken. Man vergleiche indessen *Creutzer* in *Verf.* S. 72. n. 25. Was daselbst hierüber gesagt wird, kan ich nach meiner Ansicht nur bestätigen. Hiebey stimmt auch *Sturm* *ent.* *Handb.* I. p. 94. mit ein, wiewohl dieses Herrn D. *Illiger* (*S. dessen Magaz. I. S. 35.*) noch nicht überzeugt.

SCARABAEUS NUCHICORNIS. *Fn. inf. germ.* IV. 1.

Copris nuchicornis. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 90. p. 50.

In Herrn D. *Illigers* *Magaz. I. p. 32. n. 5. a.* muß diese bey *Copris fracticornis* citirte Figur der *Fn. inf.* wegfallen, da ich hier ganz unstreitig die *Copris nuchicornis* vorgestellt habe; auch wollte Herr *Creutzer* *Verf. p. 64.* ia wohl nicht sagen, daß meine *Copr. nuchicor.* und *fracticornis* — nur eine und eben dieselbe Art wären. Das konnte er auch nicht!

SCARABAEUS FRACTICORNIS. *Fn. inf. ger.* XLIX. 9.

Copris fracticornis. *Fabric. Syst. Eleuth. I.*
n. 91. p. 50.

Scarab. nuchicornis. *Payk. Fn. Suec. I. n. 38.*
p. 31.

Creutzer *Verf. p. 64.*

Illiger

Illiger Magaz. I. n. 5. a. p. 32.

Die von mir angeführten Schäfferfchen Figuren fallen weg.

SCARABAEVS XIPHIAS. Fn. Inf. germ. XLIX. 8.

Copris Xiphias. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 92, p. 50.

Nur eine Abänderung der *Cop. nuchicornis*, nach Illigers und Creutzers richtiger Bemerkung.

SCARABAEVS HYBNERI. Fn. Inf. germ. LXVII. 5.

Copris Hybneri. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 107, p. 53.

Ist nur das *Männchen*, wozu *Cop. Alces* als das *Weibchen* gehört. Vergl. Illig. Mag. III. p. 149.

SCARABAEVS AVSTRIACVS. Fn. Inf. germ. XII. 6.

Copris austriaca. Sturm. ent. Handb. I. n. 88, p. 103.

Schäffer Ic. Inf. ratisb. tab. 73. fig. 4. 5. et tab. 96. fig. 1.

Panzer System. nomenclat. d. Schöff. Inf. n. 4. 5. p. 89. n. 1. p. 107.

Ganz sicher gehören diese Schäfferfchen Figuren hieher, wie auch ich mich aus den Schäfferfchen Originalmahlereyen überzeugt habe. Diese Art ist außerdem durch den Umriss des Kopfes und des Bruststückes von *Copr. fracticornis* Fabr. standhaft verschieden.

SCA-

SCARABAEVS SEMICORNIS Fn. Inf. germ. LVIII. 10.

Bey der Anzeige der auf dieser Kupfertafel vorkommenden Figuren, ist noch nachzuholen, daß fig. c. den clypeum antice visum cum corniculo truncato magnitudine auctum, dieser nun unbezweifelt unter *Copris* eigenen selbstständigen Art, vorstelle. Herr D. Illiger äußerte sich in einem Schreiben an mich, über diese *Copris semicornis* Faun. inf. g. mit folgenden. „Ist eine „deutlich verschiedene Art, die wir zweymal „aus den französischen Rheindepartements, und „einmal aus Moskau erhalten haben. Letztere „stimmt genau mit der Abbildung überein. Das „eine Rheinische aber hat ein höheres am Ende „tiefer ausgebuchtes Kopfblech, dessen hintere „Seite, so wie der flach hohle Hinterkopf „glättet ist; und die vordern Halschildserhöhungen sind spitz. Das andere (♀?) hat vor dem „Hinterkopfe bloß eine scharf erhöhte einfache „Queerleiste, die hinterwärts sich in den flachen „Hinterkopf verflächt. Wir hatten diese *Copris* „sonst *bicuspis* genannt.“

SCARABAEVS SACER. Fn. Inf. germ. XLVIII. 7.

Ateuchus sacer. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1.
p. 54.

Panzer Beytr. I. p. 56. tab. 6. fig. 3. 4. 5.

Leider

Leider hat auch diese von mir veranstaltete Figur, so wie jene ältere in meinen Beyträgen an den Vorderfüßen, die Tarsen — welche sie, wie ich mich nun wohl, an mehreren seitdem genau beobachteten Exemplaren, aus verschiedenen Gegenden, überzeugt habe, in rerum natura nicht hat. Dagegen ist die in der oben (bey Geotrup. nasic.) angeführten kleinen Schrift des *Bonomo*, befindliche, bey Fig. IX. vorkommende Figur dieses Sacer, desto richtiger vorgestellt, — denn diese hat keine Tarsen an den Vorderfüßen. Leicht läßt sich indessen dieser Irrthum erklären, da so wohl ich als die Künstler mangelhafte Exemplare (in dieser Hinsicht) vor sich zu haben, wähnten.

Auf der zur *Fn. Inf.* gehörigen Kupfertafel, ist wie Herr D. *Illiger* gegen mich sehr richtig erinnert, der südeuropäische Linneische sacer, mit den beyden tuberculis clypei vorgestellt, nicht aber der in Ungerns Grenzgegenden vorkommende, den Herr D. *Illiger* pius zu nennen geneigt ist. Nur bitte ich hiebey nachzulesen, was ich bey Beschreib. des sacers in meinen Beytr. a. a. O. erinnert habe. Mir sind wohl auch Exemplare von dieser abweichenden Beschaffenheit bekannt: aber ob *deshalb* auf eine Artverschiedenheit geschlossen werden könne? — das ist doch immer noch nicht entschieden. Vergl. hiemit *Illiger*
Mag.

Mag. II. n. 1. p. 202. und A. L. Z. 1803. Nr. 353.
p. 620.

SCARABAEVS SCHREBERI. Fn. Inf. germ. XXVIII.

14.

Ateuchus Schreberi. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 32. p. 61.

Ich möchte nun wohl selbst anrathen, *Voet*
tab. 28. f. 49. bey dieser Art wegzulassen, um so
mehr, da nach *Illigers* Nachweisung aus *Olivier*
(Käf. Pr. I. n. 9. p. 45.) es sehr wahrscheinlich
ist, daß *Voet* eher *Oliviers* Scar. quadrigutt. ge-
meint haben könne, als den unfrigen. — Richtig
genug erwähnt auch *Illiger*, daß dieser *Schreberi*,
eher unter die *Coprides* als *Ateuchos* gebracht wer-
den müsse. Magaz. I. p. 319.

SCARABAEVS FLAVIPES. Fn. Inf. germ. XLVIII.

10.

Ateuchus flavipes. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 39. p. 63.

Nach Herrn *Illiger* eine *Onitis*. Mag. I. p. 319.

SCARABAEVS GEOFFROYAE. Fn. Inf. germ. XLIX.

10.

Ateuchus pilularius. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 27. p. 60. (excluso ibid. Syn. Linn.)

Gymnopleurus cantharus. Illiger Magaz. II.
n. 2. p. 201.

Ich

Ich will sehr gerne zugeben, daß *Geoffroyi* richtiger geschrieben als *Geoffroyae* sey. Nur irren die Herren *Creutzer* und *Illiger* sehr, wenn sie behaupten, ich sey es gewesen, der dies unrichtige *Geoffroyae* gebildet oder angegeben habe. *Fuesly*, *Sulzer*, *Scriba*, *Göze*, *Harrer* — geschrieben lange vor mir *GEOFFROYAE*!!

SCARABAEVS FOETENS. Fn. Inf. germ. XLVIII. 1.
Aphodius foetens. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 8.
 p. 69.

Ueber die Identität dieser Art verdient nachgelesen zu werden *Creutzer* Verf. n. 13. p. 46.

SCARABAEVS SCYBALARIUS. Faun. Inf. germ.
 XLVII. 1.

Aphodius scybalarius. Fabric. Syft. Eleuth. I.
 n. 10. p. 70.

Hicher gehört auch:

Scarabaeus fimetarius. Linn. Syft. nat. n. 32.
 p. 584. var. β .

Herbst Nat. d. Käf. II. n. 87. p. 133. tab. 12.
 fig. 2. 7.

SCARABAEVS STICTICVS. Fn. Inf. germ. LVIII. 4.

Aphodius prodromus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
 n. 11. p. 70.

Aphodius sticticus. *Creutz*. Verf. n. 7. p. 26.

Hie-

Hierher gehöret auch:

Scarabaeus nemoralis. Fn. Inf. germ. LXVII. 1.

Man vergleiche hiemit *Creutzer* Verf. p. 139.
und *Illig.* Mag. III. p. 150.

SCARABAEVS ANACHORETA. Fn. Inf. germ. XXXV.
(nicht XXXVI.) 1.

Aphodius porcus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 16.
p. 71.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 22. p. 31.

SCARABAEVS BIMACULATUS. Faun. Inf. germ.
XLIII. 2.

Aphodius bimaculatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 17. p. 71.

Hiemit vergleiche man:

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 13. p. 24. u. dessen
Mag. I. p. 20. u. 22. u. p. 321.

Von dem *Aphod. terrestris*, wenigstens von dem,
der in der Fn. Inf. germ. XLVII. 3. abgebildet
worden, ist dieser *Aphod. bimaculatus* gewis keine
Spicelart. Mein *Aphod. terrestris* hat gegen die Spi-
tze der Flügeldecken zu, diese mehr gewölbt, da
solche bey meinem *Aph. bimacul.* dagegen um vie-
les flacher sind, auch sind die crenae in den
striis bey dem *A. bimacul.* viel stärker: nicht
minder ist der hintere Rand des Bruststückes bey
dem

dem *A. terrestris*, deutlich gerandet, der es bey dem *A. bimacul.* nicht ist.

APHODIUS SVBTERRANEVS. Faun. Inf. germ.
XXVIII. 3. ed. II.

Bey dieser Art find die *striae elytror.* allerdings *crenatae*, aber nicht so in dieser Abbildung. Ich habe dieses bey der Revision der 8turmischen Mahlerey übersehen, und bemerke dagegen, das demohngeachtet der wahre *Aphod. subterr.* hier gemeint ist.

SCARABAEUS CONFLAGRATVS. Faun. Inf. germ.
XLVII. 2.

Aphodius conflagratus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 20. p. 72.

Varietatem A. scybalarii putat Illiger, an merito? fragt Fabricius a. a. O.; und nur bejahend kan diese Frage beantwortet werden.

SCARABAEUS CONSPURCATVS. Faun. Inf. germ.
XLVII. 5.

Aphodius conspurcatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 22. p. 73.

Man lese hierüber nach:

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 15. p. 25. dann
Creutz. Verf. n. 5. p. 21. und
Illiger Mag. I. n. 15. b. p. 24 u. 25.

nur

nur fällt bey letztern das Citat, *Sc. nubilus* Fn.
Inf. germ. LVIII. 3. hinweg.

APHODIUS INQVINATVS. Faun. Inf. germ. XXVIII.
 7. ed. II.

Creutz. Verf. I. n. 6. p. 24.

Hierher gehört mit mehr Recht, als zum vorhergehenden:

Scarabaeus nubilus. Fn. Inf. germ. LVIII. 3.

SCARABAEVS SORDIDVS. Fn. Inf. germ. XLVIII. 2.

Aphodius sordidus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
 n. 26. p. 74.

Creutzer Verf. n. 14. p. 49.

SCARABAEVS VESPERTINVS. Faun. Inf. germ.
 LXVII. 3.

Aphodius Anachoreta. Fabric. Syst. Eleuth. I.
 n. 28. p. 74.

Aphodius lividus. Creutz. Verf. n. 12. p. 44.
 tab. I. fig. 7. a.

Nach Herrn *Creutzers* Vorgange, würde auch
 ich die lichtere Farbe der Flügeldecken, als die
 Grundfarbe derselben ansehen: *Fabrizius* hat das
 Gegentheil gewählt.

SCARABAEVS GRANARIUS. Fn. Inf. germ. XLIII. 3.

Aphodius granarius. Fabric. Syst. Eleuth. I.
 n. 29. p. 75.

Die von mir ebenfalls gebrauchten *Linn.* und
Herbst. Citata fallen weg, dafür gehört hierher:

Apho.

Aphodius granarius. Illiger Kug. Käf. Pr. I.
n. 11. p. 22.

Vergleiche damit *Illigers* Mag. I. p. 22. und
p. 322.

Aphodius pusillus. Faun. Inf. germ. XLIX. 11.
als die Abänderung mit braunrothen Flügel-
decken.

Dagegen fällt ferner weg: *Schäffer ic. inf. ra-
tisb. tab. 144. fig. 5. 6.*

Vergleiche damit, meine *system. Nomenclat. der
Schäffersch. Insekt.* p. 139.

so wie bey *Illiger* Mag. I. p. 22. *Scarab. tristis*
Faun. Inf. germ. LXXIII. 1. als eine eigene
für sich bleibende Art, hinwegfallen muß.
Jedoch scheint aller Wahrscheinlichkeit nach
Scarab. sanguinolentus. Fn. Inf. germ. XLIII. 4.
nach Herrn Sturms Versicherung (dessen
Handb. I. p. 94.) als zufällige Abänderung
hierher zu gehören.

APHODIUS NITIDVLVS. Fn. Inf. germ. XCI. 2.

Ich kan nun allerdings die frühere Vermuthung
des Herrn *Creutzers* (Verf. p. 43. u. 56.) dafs:

Scarab. merdarius. Fn. Inf. germ. XLVIII. 3.
(exclusa omni Synonymia)

so wie es mich nun selbst, ein genau angestellter
Vergleich mit dessen *A. icterico* a. a. O. lehrte,
gewis nichts anders ist, als dessen *A. ictericus*
oder

oder dieser *A. nitidul.* Fabr. selbst, ia nicht einmal Abänderung: nur ist bey Zeichnung desselben, der dunkelbraun schattirte clypeus übersehen, und die Flügeldeckennaht übertrieben breit, schwarz, angegeben worden. Demnach ist dieser *Sc. merdar.* Faun. l. c. auf keinerley Weise, mit dem ungleich größern *Aph. sordidus*, wie Herr D. Illiger an mich schriftlich erwähnte, in Verbindung zu bringen.

SCARABAEVS LVRIDVS, Fn. Inf. germ. XLVII. 6.

Aphodius luridus. Fabric. Syst. Eleuth. I.

n. 37. p. 76.

Nachgelesen zu werden verdient im hohen Betrachte, was Herr D. Illiger Mag. I. p. 323. über das *forte generatione hybrida orta?* Fabr. l. c. commentirt hat. Außerdem leidet es nach so manchen Bestätigungen keinen Zweifel mehr, daß dieser *A. luridus* nur Spielart des *A. nigripes* F. seye.

SCARABAEVS RVFIPES, Fn. Inf. germ. XLVII. 10.

Aphod. rufipes. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 35.

p. 76.

Vergleiche über das Linne'sche Citat, *Scarab. rufip.* Linn. welches nun hierher gehört: Illig. Mag. III. p. 150.

SCARABAEVS CONTAMINATIVS. Faun. Inf. germ.
XLVII. 7.

Die in der Fn. Inf. a. a. O. gebrauchten Citata des *Fabrizius* und *Herbst* fallen hinweg: dagegen gehören folgende hieher:

Scarabaeus tessulatus. Paykull. Fn. Suec. I. n. 24.
p. 20.

Aphodius tessulatus. Creutz. Verf. n. 8. p. 29.
Vergleiche hiemit *Illiger* M. I. p. 321. n. 23.

SCARABAEVS SPHACELATIVS. Faun. Inf. germ.
LVIII. 5.

Aphodius consputus. Fabric. Syst. Eleuth. T. I.
n. 40. p. 77. (excluso Synonym. *Creutz.*)

Aphodius prodromus. Creutz. Verf. I. n. 10.
p. 37.

Aphodius prodromus. Illiger Mag. I. n. 16. b.
p. 26. u. p. 324.

Es kan seyn, das *Aphodius contaminat.* Fabr. Syst. Eleuth. I. p. 39. als Abänderung hieher gehört — darum eben wollte ich solchen hier nicht anführen.

SCARABAEVS LUTARIUS. Fn. Inf. germ. XLVII.
11.

Scarabaeus lutarius. Fabric. Ent. Syst. I.
n. 112, p. 35.

Apho-

Aphodius immundus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 41. p. 77.

Illiger Mag. I. n. 17 — 18. p. 28. et p. 324.

APHODIUS ELEVATUS. Fn. Inf. germ. LXXXVII. 1.

Aphodius elevatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 46.
p. 79.

Ich weis es nicht gewifs, ob diese feltene Art schon in Deutschland entdeckt worden ist, da ihr *Fabrizius* die Provence als Vaterland zuschreibt. Dafs indessen diese Art, gewifs hier vorgestellt worden ist, dafür bürgt das Exemplar selbst, welches ich vom Hrn. Prof. *Fabrizius* erhalten habe.

SCARABAEUS QVISQVILIVS. Fn. Inf. germ. XLVIII.

4. (exclusa omni synonymia).

Aphodius merdarius. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 52. p. 80.

Folglich gehört die bey *Scarab. merdarius*. Faun. Inf. germ. XLVIII. 3. stehende Synonymie hier, nicht aber die dazu gehörige Figur, die den *Aphodius ictericus* *Creutz.* zugehört.

SCARABAEUS SABULETI. Fn. Inf. germ. XXXVII. 3.

Aphodius sabuleti. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 56. p. 81.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 7. p. 21.

SCARABAEVS PUSILLVS. Fn. Inf. germ. LVIII. 8.

Aphodius arenarius. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 63. p. 82?

Aphodius arenarius. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 10.
p. 22.

Sturm. ent. Handb. n. 43. p. 50. tab. II. fig. v. V.

SCARABAEVS SCROFA. Fn. Inf. germ. XLVII. 12.

Aphodius scrofa. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 51.
p. 80.

Scarabaeus minutus. Herbst Nat. d. Käf. II.
n. 163. p. 269. tab. 18. fig. 7.

Sehr zu beherzigen, und allerdings Aufmerksam-
keit verdienend, ist diejenige Bemerkung,
welche *Creutzer* (Verf. n. 3. p. 18.) über diesen
Aphodius hier mitgetheilt hat. Es ist noch izt
nicht gewis entschieden, welchen *Aphodius* Herr
Prof. *Fabriz.* unter seinem *arenarius* gemeint ha-
be. So viel ist aber gewis richtig, dafs *Paykulls*
Scarab. arenarius Fn. *Suec.* I. n. 33. p. 27. nicht zu
diesem *pusillus* Fn. *Inf.* l. c. gehören kan, und
dafs derselbe keine andere speciem bezeichnet;
als den *Scarab. globosus* Fn. *Inf. germ.* XXXVII. 2.
Dafür bürgt die *Paykull'sche* sehr richtige, und
diesem genau anpassende Beschr. a. a. O. Aber
Herr Prof. *Fabrizius* scheint sich wirklich bey
seinem *arenarius* confundirt zu haben. Nach An-
gabe der *Ent. System.* habe er vom *Paykull* dessen

Arena-

Arenarius (unfern *globosus*) erhalten, welcher Umstand doch nicht in dem Syft. Eleuth. wiederholt wird; und doch bringt er nun, (im Syft. Eleuth.) *eine Art* unter seinen *arenarius* die von dem Paykullfchen *aren.* ganz verſchieden iſt. So viel iſt richtig: Herr Prof. *Fabrizius* ſchickte mir einſt ſeinen *Scarab. elevatus* zu, und nachher eben denſelben; unter dem Namen *Scarab. arenarius*. Vergleiche man nun dieſen *elevatus* (Faun. LXXXVII. 1.) mit dem Paykullfchen *arenarius* (Faun. XXXVII. 2.) ſo wird man, bey all der wichtigen und groſſen Artverſchiedenheit, dennoch eine ſehr bedeutende Aehnlichkeit zwiſchen dieſen beiden unmöglich beſtreiten können. Es wäre alſo doch möglich, daſs, nach dieſem Miſsgrif zu ſchließen, *Fabrizius* anfangs den Paykullfchen *arenarius* für den ſeinigen erkannt, nachgehends aber ſeine Meinung geändert, und vielleicht nun dieſen *pufillus* als ſolchen aufgenommen habe.

Uebrigens gehört — nemlich als *pufillus* — *Herbſt* tab. 18. fig. 6. nicht aber tab. 12. fig. 12. hieher, welche letztere Figur (Faun. XLIX. 11.) einige unter *A. granar.* zu bringen geneigt ſind: wiewohl ich darum nicht ſicher entſcheiden kan, weil ich dieſes Exemplar, nach welchem die angelegte Zeichnung verfertigt worden, nicht mehr beſize, um ſolche gehörig zu vergleichen.

SCARABAEVS CAESVS. Fn. Inf. germ. XXXV. 2.

Aphodius caesus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 65.
p. 82.

SCARABAEVS SEROTINVS. Fn. Inf. germ. LXVII. 2.

Aphodius serotinus. Creutz. Verf. n. 18. p. 60.
Tab. 1. fig. 11. 8.

SCARABAEVS TRISTIS. Fn. Inf. germ. LXXXIII. 1.

Dieser *tristis* gehört als eine eigene Art unter
die *Aphodien*.

SCARABAEVS NIGER. Fn. Inf. germ. XXXVII. 1.

Aphodius niger. Illiger Kug. Käf. Pr. 1. n. 14.
p. 24.

Illiger Mag. I. p. 23.

SCARABAEVS GLOBOSVS. Fn. Inf. germ. XXXVII. 2.

Scarabaeus arenarius. Paykull. Fn. Succ. I.
n. 33. p. 27.

Scarabaeus arenarius. Fabric. Syst. Eleuth.
n. 130. p. 39.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 6. p. 20.

— Mag. I. p. 20.

Das vom *Fabrizius* hier angezogene *Geoffr. I.*
n. 29. p. 86. gehört gewis nicht hieher: dies wi-
derlegt schon das verschiedene Gröſſenmaafs bei-
der, wenn auch nicht die Beschreibung wider-
ſprüche. Stünde erſteres nicht im Weege, ſo
würde ich eher *Geoffr.*, bey *Aphod. elevatus* als
bey

bey unförm *globosus* anzuföhren glauben. Herr D. Illiger schrieb mir über diesen folgendes: *eine sehr schön ausgezeichnete Art, von der ich hundert bey Calais gefangen, zum theil röthliche Stücke gesehen habe. Paykull nennt ihn Scarab. arenar. allein der Fabrizius'sche (nehmlich Syst. Eleuth. feze ich hinzu) kann es nicht seyn.*

SCARABAEVS VARIEGATVS. Fn. Inf. germ. XLVII. 8.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 18. p. 28. var. β .

Gehört unbedenklich als *Abänderung*, elytris apice lurido striatis, unter *Aphodius nigripes Fabr.*

SCARABAEVS CENTROLINEATVS. Faun. Inf. germ.

LVIII. 1.

Vergleiche Creutz. Verf. I. n. 6. p. 24. wornach, woran auch ich nicht zweifle, dieser *centrolineatus* als *Abänderung* unter *Aphodius inquinatus* F. gebracht wird.

SCARABAEVS EQVESTRIS. Fn. Inf. germ. LVIII. 2.

Gleich unbedenklich ziehe ich nun mit *Creutzer* Versuch I. n. 7. p. 26. diesen *equestris*, zu dem *Scarab. sticticus*, oder zu *Aphodius prodromus Fabric.* als eine weniger gefleckte *Abänderung*, bey der nur die Spitze des äufsern Randes am Bruststücke schmal gelb gefäumt ist.

SCA-

SCARABAEVS LIMICOLA. Fn. Inf. germ. LVIII. 6.

Gehört als Abänderung, so wie *Sc. vespertinus* Fn. Inf. germ. LXVII. 4, unter *Aphodius Anachoreta* Fabr. oder *Aphod. lividus* Creutz.

SCARABAEVS COENOSVS. Fn. Inf. germ. LVIII. 7.

Ist eine sehr problematische Art, die jedoch weder mit *granarius* noch *foetidus* vereinigt werden darf. Da ich solche nicht mehr besitze, so kan ich auch nicht angeben, wie es kam, daß diese Figur einen *dreyhöckerichten clypeus*, den ich doch nicht bemerkte, und das Bruststück keinen rothen Seitenrand hat, den ich derselben doch wohl nicht andichtete.

SCARABAEVS FORORIORVM. Fn. Inf. germ. LVIII. 9.

Herr D. Illiger schrieb mir hierüber: *stimmet mit einer aus Portugall gebrachten Spielart des Aphod. merdar. Fabr. sehr gut überein*: nur kan ich Herrn Sturm, (Handb. p. 84.) nicht ganz unrecht geben, der diese Art, doch wohl nicht, wegen der von mir als ringsherum schwarz gesäumt beschriebenen Flügeldecken, alleine, als zweifelhaft, unter *Aph. merdarius* bringt. Auch diesen besitze ich nicht mehr.

HISTER VNICOLOR. Fn. Inf. germ. IV. 2.

Hister cadaverinus. Entom. Hefte. I. n. 2.
p. 34.

HISTER

HISTER SINYATVS. Fn. Inf. germ. LXXX. 1.

Hister cruciatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 19.
p. 87.

Hieher gehört, als eine von diesem *cruciatus* nicht wesentlich verschiedene Abart, der *Hist. lunatus* Fabric., der bekanntlich mit dem *Hist. quadrimacul.* Linn. nur eine und eben dieselbe Art bestimmt. Man vergleiche hierbey:

Entom. Hefte. I. n. 4. p. 41. und p. 121.

Dagegen fällt die ehehin, *Fn. Inf. LXXXI.* 1. angeführte Synonymie (ausgenommenen *Voet. Coleopt.* tab. 31. fig. 3.) hinweg, ingleichen das in den *Entom. Heften*, n. 5. p. 44. bey *H. sinuatus* angezogene Citat aus der *Fn. Inf.*

HISTER BIPVSTVLATVS. Fn. Inf. germ. LXXX. 3.

Hister sinuatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 17.
p. 87.

Hister fimetarius. *Ent. Hefte* I. n. 7. p. 48.

Herr Dr. Illiger äußerte sich gegen mich schriftlich hierüber mit folgendem: *In den entomol. Heften* p. 121. wird diese Behauptung zwar bestritten, allein ich habe mich von neuem überzeugt, daß Fabricius diesen Käfer, durch *elytri macula media angulata rufa*, nicht aber den *H. sinuatus* Käf. Pr., meynen konnte, wo der Flek nicht in der Mitte steht, und an der Schulter anfängt. Was Fabricius Vergleichung mit *H. cruciatus* betrifft, so wende ich dagegen ein, daß Fabricius Ver-
glei.

gleichungen, nicht allemal genau sind. — Die Verf. der entom. Hefte, werden bey wiederholtem Vergleich, und durch die gegenwärtige Bestimmung des *Hister cruciatus*, der nun den von mir ehemals genannten *H. sinuatus* vorstellt, und den selbige mit Ihrem *Sinuatus*, (nehmlich dem *Fabriz.* und *Illigerschen*) vereinigt haben, von selbst den Grund dieser anscheinenden Verwirrung finden, und solche ohne Zweifel von selbst heben, zumal, wenn es sich bestätigen sollte, daß dieser *cruciatus* nur eine bloß zufällige *Abänderung* des *H. quadrimaculati*, nemlich *Linn.* und *Illig.*, feye.

Die in der Fn. Inf. zum *H. bipustulatus* gebrachte Synonymie fällt nun hinweg, und wird durch die bey *H. sinuatus* (nun *cruciatus*) vorkommende, ersetzt.

HISTER MINUTVS. Fn. Inf. germ. XCIII. 3.

Hister flavicornis. Illiger Kug. Käf. Fr. I. n. 20. p. 62.

Hister flavicornis, Ent. Hefte I. n. 27. p. 106.

Folglich fällt die bey *H. minutus* gebrauchte Synonymie hinweg, und wird durch vorstehende, in den Ent. Heften a. a. O. ersetzt.

HISTER NASSATVS. Fn. Inf. germ. LXVII. 8.

Ist, wie mich ein wiederholter Vergleich mit dem erst späterhin, als *Eigenthum* erhaltenen, *Hister*

ster complanatus Fn. Inf. germ. XXVII. 7. belehrte, zwar eine und die nehmliche Art mit demselben, iedoch wegen der schwarzen Füße, als Abart desselben zu betrachten.

HISTER DEPRESSVS. Fn. Inf. germ. LXXX. 6.

Ist standhaft vom *H. complanatus* oder *nassatus* verschieden. Das Citat Fn. Inf. germ. 67. 8. welches in den *Ent. Heft I.* p. 99. zu *depressus* gebracht, iedoch *Heft II.* p. 127. wieder zurückgenommen worden, fällt also daselbst hinweg. Eben so ist

HISTER VVLNERATVS. Fn. Inf. germ. XXXVII. 6.
vom *Hister caesus* Fabr. als ganz verschiedene Art anzusehen,

SPHAERIDIUM COLON. Fn. Inf. germ. LXXXIV. 1.
Vergleiche *Illiger* Mag. I. n. 10. p. 329.

SPHAERIDIUM FERRUGINEVM. Faun. Inf. germ.
LXXXIV. 2.

Nitidula ferruginea. Fabric. Syst. Eleuth. I
n. 10. p. 349.

Vergleiche *Illiger* Mag. I. n. 20. p. 90. Folglich fällt die von mir bey *Sph. ferrug.* gesetzte Synonymie hinweg, und wird mit der vom Hrn. D. *Illiger* a. a. O. angegebenen emendirt,

SPHAE-

SPHAERIDIUM GLOBOSUM. Faun. Inf. germ.
LXXXIV. 3.

Ist ein *Anisotoma*.

SPHAERIDIUM SEMINULUM. Fn. Inf. germ. XXIII.
tab. 2.

Sphaeridium aeneum. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 29. p. 98.

Sphaeridium aeneum. Payk. Fn. Succ. I. n. 15.
p. 65.

Phalacrus aeneus. Illiger Mag. I. p. 41.

Vergleiche Illiger Mag. I. n. 29. p. 329. Die
von mir bey *Sphaerid. semin.* gebrauchte Synony-
mie, wird folglich nach Hrn. Illigers Nachwei-
fung a. a. O. emendirt.

ANISOTOMA GLABRA. Fn. Inf. germ. XXXVII. 9.

Hiczu gehört als Abänderung:

Sphaeridium abdominale. Paykull Fn. Succ. I.
n. 23. p. 71. et III. n. 1. p. 436.

ANISOTOMA CORVSCA. Fn. Inf. germ. XXXVII. 10.

Sphaeridium fimetarium. Paykull Fn. Succ. I.
n. 13. p. 64.

PHALACRUS CORVSCUS. Paykull Faun. Succ.
App. III. n. 1. p. 438.

ANISOTOMA CORTICALIS. Fn. Inf. germ. XXXVII.
11.

Nun *Phalacrus corticalis* Illig.

ANI-

ANISOTOMA TESTACEA. Fn. Inf. germ. XXXVII.

12.

Heißt bey uns izt, *Phalacrus geminus*: denn der Name *testaceus*, muß dem *Sphaerid. testaceo* Fabr. verbleiben, welches ein wahrer *Phalacrus* ist. Illiger.

AGATHIDIVM GLOBOSVM. Fn. Inf. germ. XXXVII.

13.

Anisotoma Seminulum. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5. p. 100.

Vergleiche hiemit Illiger Mag. I. p. 42, u. p. 330. Hr. D. Illiger nennt es izt: *Agathidium seminulum*.

BYRRHVS ATER. Fn. Inf. germ. XXXII. 2.

Gehört nach Illiger Mag. I. p. 330. zum *Byrrhus pilula* Fabr. dessen Abänderung derselbige ist. Siehe auch Mag. III. p. 151.

BYRRHVS MORIO. Fn. Inf. germ. XXXVII. 15.

Byrrhus ater. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 6. p. 104.

Byrrhus Morio. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 6. p. 93.

Folglich gehört die bey *Byrrhus ater* Fn. inf. l. c. gebrauchte Synonymie hicher und das Citat, Fn. 32. 2. fällt bey *B. ater*, in Fabr. Syst. Eleuth. l. c. hinweg: so wie Fn. 37. 2. bey *B. dorsalis* Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 7. p. 104. wegzustreichen ist.

BYRR-

BYRRHVS VNDVLATVS. Fn. Inf. germ. XXXVII.
14.

Byrrhus murinus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 8.
p. 104.

Byrrhus undulatus. Illiger Kug. Käf. Pr. I.
n. 8. p. 94.

Nur als Abänderung gehört der *B. undul.* Illig.
et Faun. nun unter *B. murin.* Fabr.

BYRRHVS MINVTVS. Fn. Inf. germ. XXV. 3.

Byrrhus minutus. Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 13,
p. 105.

BYRRHVS ORNATVS. Fn. inf. germ. XXIV. 1.

Ist eine eigene besondere Art.

TROX DVBIVS. Fn. Inf. germ. LXII. 5.

Pinelia pygmaea. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 31.
p. 133.

Byrrhus crenulatus. Roffi Faun. etrusc. app.
87. 7.

Vergl. hiemit Illigers Mag. I. n. 31. p. 338.

Dieser *Trox dubius* constituiert nach Herrn D.
Illiger eine eigene Gattung *Limnius*, wozu *Dy-*
tiscus Volkmar Fn. und andere gehören.

BOLITOPHAGVS GOEDENI. Fn. Inf. germ. XCIV. 1.

Bolitophagus interruptus. Illiger in Wiedm.
Zool. Archiv. I. 2. p. 112. n. 8.

Dafs

Dafs Herr D. Illiger diesen vom Herrn *Amts-
rath Goeden* zu Rügenwalde entdeckten Käfer,
dessen Mittheilung ich Herrn Senat. *Schneider* in
Stralfund verdanke, ehebevor schon a. a. O. be-
kannt gemacht hat, war mir damals, als ich sol-
chen für die Faun. beschrieb, nicht bekannt.

OPATRUM AGRICOLA. Fn. Inf. germ. XLIII. 9.

Bolitophagus Agricola. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 3. p. 114.

OPATRUM ARMATUM. Fn. Inf. germ. LXI. 2.

Bolitophagus armatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 4. p. 114.

SCARITES LAEVIGATUS. Fn. Inf. germ. LXVI. 1.

Scarites laevigatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 9. p. 124.

Scarites littoralis. Creutz. Verf. p. 134.

Es ist kein Zweifel an der Richtigkeit meiner
Bestimmung: dieses bestätigt Illig. Mag. III.
p. 152.

SCARITES THORACICUS. Fn. Inf. germ. LXXXIII. 1.

Scarites thoracicus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 16. p. 125.

SCARITES GIBBUS. Fn. Inf. germ. V. 1.

Scarites gibbus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 17.
p. 126.

Paykull. Fn. Suec. III. App. n. IV. p. 440.

SCA-

SCARITES CEPHALOTES. Fn. Inf. germ. LXXXIII. 1.

Carabus cephalotes. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 94. p. 187.

Gewis ein *Scarites*, nun vom *Fabriz.* in dem
Syft. Eleuth. abermals unter *Carabus* gebracht.

SCARITES GAGATES. Fn. Inf. germ. XI. 1.

Carabus clatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 104.
p. 189.

Vergleiche hiemit *Illig.* Mag. I. n. 104. p. 354.
und Mag. III. p. 154.

SCARITES PICEVS. Fn. Inf. germ. XI. 2.

Carabus terricola. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 43. p. 178.

Carabus madidus. Payk. Fn. Succ. I. n. 16.
p. 109.

Vergleiche hiemit *Illig.* Mag. I. p. 57. und n. 43.
p. 349. Herr *Creutzer* sagt in feinen Versuchen
p. 115. Obf. III. *Car. terricola Fabr. ab ipso Cel.*
viro huc missus, haud alius est, quam Scarites pi-
ceus Hellw. — Ich habe gar nichts darwider,
wenn sich dieses also verhält; nur gebe ich zu
bedenken, dafs auch ich an Hrn. Prof. *Fabrizius*
diesen *Scar. piceus* geschickt habe, ohne von Ihm
eine solche Bestimmung dagegen erhalten zu ha-
ben; dafs Hr. Prof. *Fabrizius* die Zeichnung die-
ses Scarit. in meiner Fauna, gar wohl kennt,
solche aber nirgends noch angeführt; dafs end-
lich

lich Herr Prof. *Fabrizius* — sich — wie Fälle vorhanden sind — leicht irren konnte. Am sichersten wärs jedoch, wir erhielten die Bestätigung dieser Angabe vom Herrn Prof. *Fabrizius* selbst. — Der *Carab. terricola* Fn. XXX. 3. kan nicht mit diesem verwechfelt werden.

TENEBRIO SPINIMANVS. Fn. Inf. germ. LIX. 1.

Pimelia laevigata. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 5.

p. 129.

Pimelia glabrata. Herbst. Nat. d. Käf. VIII. n. 12.

p. 56. tab. 120. fig. 12.

Vergleiche *Illiger* Mag. I. n. 5. p. 336.

TENEBRIO CURVIPES. Fn. Inf. germ. XI. 3.

Tenebrio curuipes. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 5.

p. 145.

Ich kenne Herrn *Illigers* *Tenebr. loripes* Kug. Käf. Pr. I. n. 2. p. 113. nicht genau genug, um hierüber zu entscheiden: gleichwohl überzeuge ich mich, daß das *Fabric.* Citat mit meinem *S. curuipes* ohne Anstand vereinigt werden könne.

TENEBRIO FERRUGINEVS. Fn. Inf. germ. IX. 2.

Nur das andere Geschlecht von *Tenebrio culinaris* Fab. Fn. Inf. germ. IX. 1.

TENEBRIO DIAPERINVS. Fn. Inf. germ. XXXVII.

16.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 4. p. 115.

Ist eine deutliche Art, die zwar mit Herbsts *Tenebrio ovatus* viele Aehnlichkeit hat, aber durch den Halschild hinlänglich unterschieden ist. Wir haben mehrere Stücke erhalten, die auf einem aus Portugall abgeseelten Schiffe unter Maiskörnern gefunden worden. Illiger.

TENEBRIO FAGI. Fn. Inf. germ. LXI. 3.

Mir immer noch eine problematische Art. Ich hatte nur dieses einzige mir von Hrn. v. Megerle damals mitgetheilte Exemplar zu Gesicht erhalten, das ich wieder zurückgegeben habe. Seitdem ist mir keines mehr vorgekommen.

PIMELIA VARIOLOSA. Fn. Inf. germ. LXXIV. 1.

Platynotus morbillosus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 11. p. 140.

Vergl. Illiger Mag. I. p. 339. n. 11. woselbst der *Platynot. morbill.* für eine schwarze Abänderung des grauen *Opatrum griseum* F. erklärt wird.

BLAPS FEMORALIS. Fn. Inf. germ. XXXIX. 5.

Blaps femoralis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 12. p. 143.

Opatrum femoratum. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 4. p. 109.

Ist das Männchen der nächstfolgenden Art. Vergl. Illig. Mag. I. p. 46. und p. 340.

TENEBRIO FEMORALIS. Fn. Inf. germ. XXXIX. 6.

Blaps dermestoides. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 9. p. 142. excluso Syn. Illig.

Opatrum femorale. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 5.
p. 110.

Hieher gehört ohne Zweifel auch:

Helops laevigatus. Fn. Inf. germ. L. 6.

als eine von dem vorhergehenden *Weibchen* des
Blaps femoralis Fabr. kaum zu unterscheidende
Art.

HELOPS CARABOIDES. Fn. Inf. germ. XXIV. 3.
ed. I.

Helops quisquilius. Fn. Inf. germ. XXIV. 3.
ed. II.

Helops dermestoides. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 2.
p. 120. excluso Syn. Fabric.

Helops striatus. Oliv. Inf. III. 58. p. 6. n. 4.
tab. I. fig. 4.

Der Helops ruficollis Fabr. ist sicher nichts, als
ein unreifer eben entwickelter Käfer dieser Art.

Illiger. Vergl. Illig. Mag. I. n. 47. p. 344.

HELOPS CHRYSOMELOIDES. Fn. Inf. germ. LVII. 1.

Eine unter *Carops* gehörige Art, die noch näher
bestimmt werden muß.

HELOPS DERMESTOIDES. Fn. Inf. germ. LVII. 2.

Ptomophagus truncatus. Illig. Kug. Käf. Pr. I.
n. 3. p. 89.

C

Vergl.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 42. Hieher gehört höchst wahrscheinlich als *Abänderung mit braunen Flügeldecken*:

Helops sericeus. Fn. Inf. germ. LXXIII. 1.

HELOPS FUSCUS. Fn. Inf. germ. XVIII. 1.

Catops sericeus. Paykull Fn. Suec. I. n. 1.
p. 342.

Diese Art muß in das künftige Catops fuscus genannt werden, weil Catops sericeus Payk. nicht der Cat. seric. Fabric. ist, der einerley mit Ptomophag. fornicat. Illig. ist. Illig.

HELOPS TRISTIS. Fn. Inf. germ. VIII. 1.

Catops Morio. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 4.
p. 564.

In dem Syst. Eleuth. müssen, außer der Entom. syst. die übrigen Citate wegfallen. Illiger.

HELOPS PICIPES. Fn. Inf. germ. XXIV. 4.

Cistela maura. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 21.
p. 20.

Hieher gehört als identische species, auch

Cistela brevis. Fn. Inf. germ. XXV. 17.

Vergl. Illiger Mag. III. n. 21. p. 162.

HELOPS LATICOLLIS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 1.

ist das *Männchen* von *Blaps glabra* Fabric. et Faun. Inf. germ. L. 1. Vergl. Illig. Mag. III. p. 153.

HELOPS SHNEIDERI. Fn. Inf. germ. XXXIV. 1.

Hypophloeus Boros. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 2. p. 558.

Tragostita corticalis. Paykull. Fn. Succ. I. n. 3.
p. 93.

Boros elongatus. Herbst Nat. d. Käf. VII. n. 1.
p. 319. tab. 110. fig. 7.

HELOPS SERRATUS. Fn. Inf. germ. IX. 3.

Melandrya ferrata. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 1. p. 163.

HELOPS CANALICULATUS. Fn. Inf. germ. IX. 4.

Melandrya canaliculata. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 2. p. 164.

CARABUS MARGINALIS. Fn. Inf. germ. XXXIX. 7.

Nach Herrn D. Illigers Bemerkung eine Abänderung des *Car. violac. F.* Vergl. desselb. Mag. I.
p. 49. und n. 4. p. 345.

CARABUS WEIGELII. Fn. Inf. germ. LXXXIV. 4.

Carabus nodulosus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 14. p. 171.

CARABUS GEMMATVS. Fn. Inf. germ. LXXIV. 2.

Hieher gehört:

Carabus hortensis. Linn. Syst. Nat. n. 3. p. 668.
welcher bey *C. hortensis* Fn. Inf. germ. IV. 3.
auszustreichen.

CARABVS SYLVESTRIS. Fn. Inf. germ. V. 3.

Carabus sylvestris. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 19. p. 173.

CARABVS SCHEIDLERI. Fn. Inf. germ. LXVI. 2.

Carabus Scheidleri. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 24. p. 174.

Vergl. Creutzer Versuch p. 133.

CARABVS ARVENSIS. Fn. Inf. germ. LXXIV. 3.

Ist aus Versehen Fn. Inf. LXXXI. 3. nochmals
abgebildet worden.

CARABVS CONVEXVS. Fn. Inf. germ. LXXIV. 5.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 38. fig. 3. ge-
hört zwar allerdings hierher, aber auch tab. 3.
fig. 2.

CARABVS GRANVLATVS. Fn. Inf. germ. LXXXI. 6.

Hierher gehört auch Schäffer Ic. Inf. ratisb.
tab. 18. fig. 9. welche bey *Carab. cancellatus* Fabr.
hinwegfällt.

CARABVS FASCIATO PUNCTATVS. Faun. Inf. germ.
LXVII. 9.

Carabus fasciatopunctatus. Fabric. Syft.
Eleuth. I. n. 42. p. 178.

Carabus fasciatopunctatus. Creutz. Versf.
p. 111. n. 4. tab. 2. fig. 16. a.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 57.

CARABVS NIGRITA. Fn. Inf. germ. XI. 13.

Carabus maurus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 45. p. 178.

Herrn Prof. *Fabrizius* schickte ich solchen, unter *Carab. anthracinus* zu, woraus sich nun dessen Citat hiebey erklären läßt. Schwerlich gehört derselbe aber hieher. Vergl. *Illig. Kug. Käf. Pr. I.* n. 55. p. 181.

CARABVS LEUCOPHTHALMVS. Faun. Inf. germ.
XXX. 1.

Carabus niger. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 46.
p. 179.

Carabus niger. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 56.
p. 182.

Vergl. *Illiger Mag. I.* n. 46. p. 349. dessen richtigere Synonymie, nur mit Ausschluss *Schäffer* Ic. Inf. ratisb. tab. 18. fig. 1. hieher gehört.

CARABVS PLANVS. Fn. Inf. germ. XI. 4.

Carabus planus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 47.
p. 179.

Carabus leucophthalmus. Illig. Kug. Käf. Pr. I.
n. 58. p. 183.

Carabus leucophthalmus. Linn. Syst. Nat. n. 4.
p. 668.

CARABVS PICICORNIS. Fn. Inf. germ. XCII. 1.

Carabus picicornis. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 55.
p. 180.

Ca-

CARABVS SPINIBARBIS. Fn. Inf. germ. XXX. 6.

Carabus spinibarbis. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 61. p. 181.

Vergleiche *Carab. terminat*. Fn. p. 44.

CARABVS DIANAE. Fn. Inf. germ. XXX. 8.

Carabus humeralis. Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 63. p. 181.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 63. et 66. p. 350 — 51. III. p. 154.

CARABVS AFFINIS. Fn. Inf. germ. LXXIII. 9.

Carabus angusticollis. Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 64. p. 182.

Carabus angusticollis. Illig. Mag. I. p. 55.

CARABVS BOREALIS. Fn. Inf. germ. LXXV. 8.

Carabus borealis. Fabr. Syft. Eleuth. I. n. 69. p. 183.

CARABVS SPOLIATVS. Fn. Inf. XXXI. 6.

Carabus spoliatus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 72. p. 183.

CARABVS CINCTVS. Fn. Inf. germ. XXX. 7.

Ist eine befondere, aber nicht die Fabrizzische Art: Ich nenne diesen Käfer, den wir vom Rossi, als einen Sardinischen erhalten haben, und den er auch cinctus nennt, Carabus circumscriptus. Es gibt in Ostindien mehrere ähnliche Arten. Illiger.

Nicht

Nicht geringen Anstand fand ich schon damals; als ich diesen *Carabus* für die *Fn. Inf.* zeichnen liefs, bey der Bestimmung deselben. Soll nun *Herbst* Archiv tab. 29. fig. 7. den *C. cinctus Fabr.* vorstellen, den ich nicht kenne, so ist der meinige zwar allerdings von demselben verschieden, gleichwol wird man finden, dafs die *differentia specifica* in dem *Syst. Eleuth.* auf beide anwendbar ist. Es würde demuach nur *Carabus cinctus Ross.* *Fn. Etrusc. I. n. 523. p. 212. tab. IV. fig. 9.* hieher gehören.

CARABVS FESTIVVS. *Fn. Inf. germ. XXX. 15.*

Carabus festivus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 74. p. 184.

Carabus marginatus. Ross. Fn. Etrusc. I. n. 524. p. 251.

Vergl. hiemit *Illiger Mag. I. n. 74. p. 351.* Herr D. *Illiger* wirft hiebey die Frage auf: Ist *C. zonatus Panz. Fn. germ. 31. tab. 7.* Abart? oder ist er *C. agrorum Oliv. Inf. 35. 86. 117. tab. 12. fig. 144.* und *Geoffr. Inf. I. 162. 41?*

CARABVS ZONATVS. *Fn. Inf. germ. XXXI. 7.*

Ist, wie ich nun wohl sehe, vom vorhergehenden *C. cinctus Fn. et Rossi* hinlänglich verschieden; gewis ist ers aber auch vom *C. festivus*, oder *C. marginat. Rossi.* Dasienige Exemplar,
nach

nach welchem diese Zeichnung verfertigt worden, besitze ich nicht mehr. Auch glaube ich nicht, daß *Geoffr. I. n. 41.* hier mit in Verbindung kommen könne, zu welcher Verneinung, sowohl in der abweichenden Beschreibung, als in der gar zu verschiedenen Gröfse beider, hinreichende Gründe liegen. *Olivier* kan ich nicht vergleichen.

CARABVS EXCAVATVS. Fn. Inf. germ. XXXIV. 2.

Carabus rufipes. Fabr. Syst. Eleuth. I. n. 75.
p. 184.

Vergl. *Illig. Mag. III.* p. 154. und *Mag. I.* p. 58.

CARABVS AGILIS. Fn. Inf. germ. LXXV. 11.

Carabus agilis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 83.
p. 185.

Hierher gehört nach *Illigers Mag. I. n. 83.*
p. 352, ohngeachtet der anscheinenden Verschiedenheit:

Carabus atricapillus. Fn. Inf. germ. XXX. 9.

CARABVS TAENIATVS, Fn. Inf. germ. XXXIV. 3.

Carabus oblongus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 90. p. 186.

CARABVS PAVIDVS. Fn. Inf. germ. LXXIII. 7.

Carabus pallipes. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 91. p. 187.

CARABVS TENEBROIDES. Fn. Inf. germ. LXXIII. 8.

Carabus gibbus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 105.
p. 189.

CARABVS DEPRESSVS. Fn. Inf. germ. XXXI. 8.

Carabus cassideus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 108. p. 190.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 23. p. 159.

CARABVS SABVLICOLA. Fn. Inf. germ. XXX. 4.

Carabus sabulicola. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 110. p. 190.

Nicht nur im Oestreichischen, sondern auch um Göttingen sehr häufig. Herr D. Illiger hält diese Art nur für eine *Abänderung* des *C. obscurus*. Sonach käme die Abänderung weit öfters vor als die Stammart.

CARABVS BINOTATUS. Fn. Inf. germ. XCII. 3.

Carabus binotatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 126. p. 193.

Ogleich ein und anders, was Herr D. Illiger bey diesem *C. binotatus* Kug. Käf. Pr. I. n. 37. bemerkt, nicht ganz zutrifft, so zweifle ich doch nicht an der Richtigkeit dieser Bestimmung.

CARABVS KUGELANI. Fn. Inf. germ. XXXIX. 8.

Carabus dimidiatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 129. p. 194.

Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 30. p. 166.

Nicht

Nicht bezeichnete ich diesen schönen Käfer, mit dem Namen eines so vorzüglichen Entomologen, *um die Aufmerksamkeit (?) auf sich zu ziehen*, sondern *darum* behielt ich den Namen *Carab. dimidiatus*, unter welchem derselbe mir von dem Herrn Prof. Hellwig zugeschiedt worden ist, nicht bey, weil *Fn. Inf. germ. XXXVI. 3. bereits ein Carabus dimidiatus vorgekommen ist.*

CARABUS ALPINUS. *Fn. Inf. germ. LXXV. 7.*

Carabus alpinus. Fabric. *Syst. Eleuth. I. n. 140. p. 196.*

Man vergleiche *Illig. Mag. I. n. 140. p. 355.* wofelbst

Carabus torridus. *Fn. Inf. germ. XXXVIII. 2.*

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 42. p. 173.

als *schwarze Abänderung* hierher gebracht wird. Man vergleiche übrigens dieser beiden Abbildung. Ich besitze den *C. torridus* nicht, um hierüber mich zu erklären.

CARABUS CHLOROPHANUS. *Fn. Inf. ger. LXXIII. 3.*

Carabus azureus. Fabric. *Syst. Eleuth. I. n. 145. p. 196.*

Vergl. *Illig. Mag. I. p. 51.*

CARABUS AENEUS. *Fn. Inf. germ. LXXV. 4.*

Carabus aeneus. Fabric. *Syst. Eleuth. I. n. 146. p. 197.*

Hic-

Hierher gehört mit Recht, als Abänderung:
Carabus azureus. Fn. Inf. germ. LXXV. 3.

Vergl. *Illig. Mag. I. n. 146. p. 356.*

CARABUS ATERRIMVS. Fn. Inf. germ. XXX. 12.

Carabus aterrimus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
 n. 155. p. 198.

Herr D. *Illiger* glaubt, daß zwar diese Abbildung den *C. aterr. F.* vorstelle, daß solche jedoch nicht zum besten gerathen seye. — Das glaube wohl auch ich, nur muß ich anfügen, daß dieser *aterr.* vom Herrn *Sturm* richtig gezeichnet, nur nachher erst von den Illuministen verdorben worden.

CARABUS NIGRICORNIS. Fn. Inf. germ. VI. 4.

Carabus austriacus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
 n. 157. p. 199.

Der *Fabriz.* *C. nigricorn*, gehört als *Abänderung* unter *Car. holoserice. F.*

CARABUS CONFLVENS. Fn. Inf. germ. XXX. 22.

Carabus nigrita. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 164.
 p. 200.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 47. p. 175.

Der *Carab. conflvens* Fn. gehört nur als eine etwas ungewöhnliche *Ausart* hierher. Vergl. *Illig. Mag. I. p. 154.*

CARABUS LUTESCENS. Fn. Inf. germ. XXX. 20.

Carabus picipes. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 183.
p. 203.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 85. p. 199.

CARABUS TERMINATUS. Fn. Inf. germ. VII. 2.

Leistus testaceus. Frölich Naturf. XXVIII.
p. 8. n. 1. tab. 1. fig. 9.

Carabus rufescens. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 191. p. 205.

Vergl. Illiger Kug. Käf. Fr. I. p. 59. und n. 70.
p. 190. wornach auch folgende, als Spielarten,
hieher gehören:

β *Carabus Bruçteri*. Fn. Inf. germ. XXXIV. 4.
var. *elytris obscurioribus*.

γ *Carabus spinilabris*. Fn. Inf. germ. XXXIX.
11. var. *elytris apice concoloribus*.

Carabus spinilabris. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 189. p. 204.

Desgleichen gehört auch hieher:

δ *Manticora fuscoaenea*. Fn. Inf. germ. LXXXIX.

3. var. *elytris pallidioribus: apice concoloribus*.

Dieser *Carabus rufescens* Fabr. mit seinen eben
genannten, bis igt bekannten Abänderungen, be-
stimmt zugleich mit:

Carabus spinibarbis. Fn. Inf. germ. XXX. 6.

Manticora pallipes. Fn. Inf. germ. LXXXIX. 2.

Carabus spinibarbis. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 61. p. 181.

eine

eine eigene Gattung, zu welcher, theils bereits ehebevor Herr D. *Illiger* Kug. Käf. p. 190. u. f., theils Herr D. *Frölich* im Naturforscher XXVIII. p. 8. die charakteristischen Kennzeichen angegeben haben, und zwar letzter, unter der Benennung *Leistus*, so wie *Latreille* unter dem Namen *Pogonophorus*. Die Idee des Herrn Prof. *Jurine*, solche der Gattung *Manticora* einzuverleiben, — und die ich, wie ich nun gerne gestehe, mit Vernachlässigung der von mir bisher strenge beobachteten Observanz, nur die *Fabrizius'schen* Gattungen beyzubehalten, jedoch um dem Antrag des Herrn Prof. *Jurine* meine Achtung zu bezeugen, hier in einen sonst ungewöhnlichen Umlauf gebracht habe, scheint nach dem Urtheil mehrerer einsichtsvollen Entomologen, unter welchen ich besonders Herrn D. *Illiger* in Braunschweig nennen darf, sehr vieles wider sich zu haben, um auf eine vollkommene Realisirung, Ansprüche zu machen. Ohne noch selbst im Stand zu seyn, die Verschiedenheit der Fresswerkzeuge an einem Exemplar der *Manticorae Fabric.* beobachten zu können, so sind doch solche, so wie solche vom *Latreille* und *Olivier* beobachtet worden sind, besonders in Rücksicht der Lippe, und daß die Erdspize der Kinnlade (der *Manticorae*) mit der Kinnlade zusammengegliedert ist, so geeignet, und zwar, wenn man auch auf die übrige

ge Beschaffenheit mit hinsehen will, zumal die Flügeldecken den ganzen Hinterleib umfassen, auch übrige Umrisse und Verhältnisse so verschieden, daß eine solche Vereinigung nicht statt finden kan.

CARABVS VNIFASCIATVS. Faun. Inf. germ. XXXVIII. 7.

Carabus Discus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 200. p. 207.

CARABVS VERNALIS. Fn. Inf. germ. XXX. 17.

Carabus vernalis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 202. p. 207.

Vergl. *Illig.* Mag. I. p. 53. u. n. 202. p. 359. wofelbst an diesem Citat gezweifelt wird: indeffen habe auch ich diesen *Carab.* unter meiner frühern Benennung Herrn Prof. *Fabrizius* zugeschickt, und nicht selten gesehen, daß dieser Käfer auch mit braunen Füßen vorkomme.

CARABVS ABBREVIATVS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 2.

Carabus abbreviatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 215. p. 209.

Anthophagus caraboides. Gravenhorst. coleopt. micropt. n. 1. p. 121.

CARABVS AQUATICVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 10.

Carabus minutus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 218. p. 210.

CARABVS ORICHALCEVS. Faun. Inf. germ.
XXXVIII. 11.

Carabus pygmaeus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 219. p. 210.

CARABVS VESPERTINVS. Fn. Inf. germ. XXXVII.
tab. 6.

Hierüber laſſe ich Herrn D. Illiger ſelbſt ſprechen: *Dieſer C. vespertinus iſt eine beſondere Art, wovon die Abänderungen häufiger ſind, deren Flügeldecken faſt ganz ſchwarz und blaß am Außenſaum ſind. Solche nennt Herr v. Megerle im Wiener Auctions Catalog Carab. Ziegleri. Meine Vermuthung, daß Carab. cruciger Fabric. dieſer vespertinus ſeye, iſt falſch. Fabricius cruciger iſt nichts als C. merdarius; die differentia ſpecifica des alten Käfers hat ihn verleitet, ihn noch einmal anzunehmen, weil die futura in ienen nicht angegeben war. Der Name C. vespertinus bleibt alſo.*

CARABVS CISTELOIDES. Fn. Inf. germ. XI. 12.

Vom Car. fuscus Fabr. oder C. ambiguus Paykull. iſt er ſtandhaft verſchieden. Illiger. Jedoch gehört Schaffer. Ic. Inf. ratisb. tab. 18. fig. 7. hieher. Vergl. meine ſystem. Nomencl. der Schaff. Inf. p. 25.

CARABVS TERRICOLA. Fn. Inf. germ. XXX. 3.

Carabus subcyaneus. Illig. Mag. I. p. 57.

Vergl. Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 59. p. 184.

Ich will sehr gerne zugeben, daß dieser *terricola*, oder nun dieser Illigersche *subcyaneus*, nicht der *C. terricola* Fabric. seye. S. oben *Scarit. piceus*: indessen wenn es auf den Umstand *alleine* ankommt, daß der wahre Fabric. *C. terricola*, *elytra striis levibus*, oder *impunctatis* haben soll, so kan der *Scar. piceus*, oder *Carab. madidus* Payk. der wohl keine *elytra striis levibus* hat, kaum auch hieher gerechnet werden.

Carabus subcyaneus bestimmt eine eigene Art: nur kan

Carabus inaequalis. Fn. Inf. germ. XXX. 18. deswegen nicht hieher gerechnet werden; weil dessen *elytra nigra nitida striis levibus*, allzusehr mit den *elytris obscuroidis opacis punctato striatis* des *subcyanei*, contrastiren. Außerdem ist dieses Exemplar, nach welchem die Zeichnung für meine Fn. Inf. verfertigt worden, noch ein unreifes, nur ohnlängst seinen Nymphenstand verlassen habendes Exemplar, welches dessen *elytra fuscescentia* zur Genüge beweisen.

CARABVS ARTICULATVS. Fn. Inf. XXX. 21.

Ich zweifle jedoch an der Identität dieser vorgeschlagenen Art. Nach Herrn D. Illigers Gutachten,

achten, ist dieser *articulat*, dennoch von der *bun-*
ten Abänderung des *Carabus pulchelli* Fn. Inf.
 germ. XXXVIII. 18. verschieden, weswegen nun
 auch dieses Citat in *Ill. Kug. Käf. Pr. bey E. qua-*
drim. var. β. p. 233. hinwegfällt.

CARABVS DIMIDIATVS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 3.

Wahrscheinlich ein Gravenhorstfcher *Antho-*
phagus, den ich iedoch in den Coleopteris mi-
 cropteris vermisste.

CARABVS VIDVVS. Fn. Inf. germ. XXXVII. 18.

Eine besondere Art, wahrscheinlich *Carabus*
verralis Payk. Fn. Suec. I. 133. 46. und *Carabus*
obscurus Payk. Mon. Car. 40.

CARABVS NIVALIS. Fn. Inf. germ. XXXVII. 19.

Carabus vivalis. Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 79.
 p. 197.

In dem mir vom Herrn Prof. *Hellwig* zuge-
 schickten Manuskript, wofelbst dieser *Carab. vi-*
valis, nebst seiner different. specifica angezeigt
 worden, glaubte ich *deutlich* nivalis zu lesen.
 Dieser *Irrthum* wird nun in Herrn D. *Illigers*
 Kug. Käf. Pr. a. a. O. gerügt, und ich verbessere
 diesen *Irrthum* gerne, da ich nun mit der *wah-*
ren Lesart bekannt gemacht worden bin.

CARABVS EYRINOTVS. Fn. Inf. germ. XXXVII. 23.

Carabus acuminatus. Payk. Fn. Suec. I. n. 36. p. 166.

Nicht *Eyrinotus*, sondern *Eurynotus* muß in der Fn. Inf. a. a. O. gelesen werden. In Schäffers Ic. Inf. ratisb. tab. 194. fig. 7. kommt eine sehr übelgerathene Abbildung des *Carab. acneus* Fabr. vor, nicht aber dieser *C. Eurynotus* Illig. Vergl. meine system. Nomencl. d. Schäff. Inf. p. 169.

CARABVS CRISEVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 1.

Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 38. var. β . p. 171.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 52. Herr D. Illiger schrieb mir auch nachgehends: *dieser C. griseus scheint doch vom C. ruficornis verschieden zu seyn, denn er ist standhaft nur halb so groß.*

CARABVS AVLICVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 3.

Carabus bicolor. Paykull Fn. Suec. I. n. 79. p. 159.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 53.

CARABVS TEMPESTIVVS. Fn. Inf. germ. LXXIII. 6.

Scheint C. rubens Fabr. *Ent. syst. I. n. 92. p. 187. zu seyn. Illiger.*

CARABVS HELLWIGII. Fn. Inf. germ. LXXXIX. 4.

CARABVS HOFFMANNSEGGII. Faun. Inf. germ. LXXXIX. 5.

CARABVS ILLIGERI. Fn. Inf. germ. LXXXIX. 6.

CARABVS PANZERI. Fn. Inf. germ. LXXXIX. 8.

Sind allerdings verschiedene, aber übel benannte Arten. Sollen die Namen ein Denkmahl der Erinnerung seyn, so lege man sie sehr kenntlichen unzweideutigen Arten bey. — Die schwarzen Carabi sind für den Kenner schon schwer aus einander zu finden, wie vielmehr für den blossen Dilettanten. Illiger.

Ich fühlte die Wahrheit des so eben gefagten nur zu sehr, als ich diese von der Natur mit so kargen Signaturen dotirten Carabos in der Fn. Inf. aufnahm. Aber ihre einmal von Herrn v. Megerle ihnen zugetheilten Namen, wollte ich nicht ändern.

CARABVS PVLCHELLVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 8.

Bembidium quadrimaculatum. Illig.

Elaphrus quadrimaculatus. Illig. Kug. Käf. Pr. I.

n. 17. p. 232.

Herr D. Illiger, nemt nun mit Latreille, (vergl. Illig. Mag. III. n. 9. p. 11.) die schon ehebevor errichtete 2te Familie der Elaphror. (Kug. Käf. Pr. I. p. 226.) *palpis apice mucronatis*, *Bembidion*, unter welche mehrere, auch in meiner Fn. Inf. abgebildete, nun gehören.

CARABVS DECORVS. Fn. Inf. germ. LXXIII. 4.

Bembidium rufipes. Illig.

Elaphrus rufipes. Illig. Mag. I. p. 63.

Diese Bestimmung bestätigt nun Herr D. Illiger selbst.

CARABVS QVADRINOTATVS. Faun. Inf. germ. LXXIII. 5.

Bembidium spilotus. Illig. Kug. Käf. Pr. I. p. 234.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 64.

CARABVS DORIS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 9.

Bembidium Doris. Illig.

Elaphrus Doris. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 16. p. 232.

CARABVS LITTORALIS. Fn. Inf. germ. XL. 6.

Elaphrus rupestris. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 246.

Bembidium rupestre. Illig.

Elaphrus rupestris. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 13. p. 230.

CARABVS STURMII. Fn. Inf. germ. LXXXIX. 9.

Bembidium Sturmii. Illig.

Bembidium posticellum. Illig. alias, f. d.

ELAPHRVS PALVDOSVS. Fn. Inf. germ. XX. 4.

Bembidium paludosum. Illig.

Hin-

Hinlänglich vom *Bembid. impress.* oder dem *Elaphr. impress.* Fn. Inf. germ. XL. 8. et *Fabric.* verschieden.

ELAPHRVS RVFICOLLIS. Fn. Inf. germ. XXXVIII.
21.

Bembidium ruficalle. Illig.

Eine sehr distinkte species.

ELAPHRVS AQUATICVS. Fn. Inf. germ. XX. 3.

Elaphrus semipunctatus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 8. p. 246.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 1. p. 224,

Vergl. Illig. Mag. I. n. 7. p. 66,

CICINDELA ANGVSTATA. Fn. Inf. germ. X. 1.

Odacantha melanura. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 1. p. 228.

Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 93. p. 209.

SCOLYTVS AENEVS. Fn. Inf. germ. VIII. 2.

Diaperis aenea. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 5.
p. 586.

Herr Prof. *Fabric.* citirt den *Scolytus aeneus* Fn.
bey *Diaperis bicolor*, dieser ist aber hinlänglich
hievon verschieden. Vergleiche Fn. Inf. germ.
XCIV. 9.

HYDROPHILVS SCARABAEOIDES. Faun. Inf. germ.
LXVII. 13.

Hydro-

Hydrophilus scarabaeoides. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 251.

Wahrscheinlich hat diese sonderbare Zeichnung Veranlassung gegeben, daß diese Figur noch nirgends, und zumal nicht bey *Hydr. scarab.* angeführt worden ist. So viel ist gewis, daß mein Exemplar, nach welchem diese Zeichnung für meine Fn. Inf. verfertigt worden ist, mit dem *Hydr. scarab. Fabr.* allerdings übereinkomme, nur sind die mittlern Streifen der Flügeldecken an der Basis derselben nicht stark genug, oder nur weniger sichtbar, wie bey andern Exemplaren, die ich damit verglichen habe, und darum sind solche, gleichsam als ob sie ganz fehlten, welches aber nicht ist, gar nicht angezeigt worden.

HYDROPHILUS CHRYSOMELINUS. Fn. Inf. germ. LXVII. 14.

Hydrophilus griseus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 24. p. 253.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 24. p. 368. Auch *Hydr. bicolor Fabr.* gehört hieher.

HYDROPHILUS BIPUNCTATUS. Faun. Inf. germ. LXVII. 15.

Hydrophilus bipunctatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 26. p. 254. so wie

Hydro-

Hydrophilus striatulus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 25. p. 254.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 26. p. 369.

HYDROPHILVS SCROBICVLATVS. Fn. Inf. germ.
LXVII. 11.

Eine eigene Art, die mir seitdem nicht wieder
vorgekommen ist.

DYTISCVS STRIATVS Mas. Faun. Inf. germ.
LXXXVI. 5.

Dytiscus fuscus. Fabric. Syst. Eleuth, 1. n. 17.
p. 261.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 69. und n. 16. p. 370.
Folglich muß mein *D. striat.* Fn. auch unter
D. fuscus Fabr. gehören.

DYTISCVS ZONATVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 13.

Dytiscus zonatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 22. p. 262.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 6. p. 257.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 69.

DYTISCVS AENEVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 16.

Dytiscus fenestratus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 32. p. 264.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 32. p. 371.

DYTISCVS FENESTRATVS. Fn. Inf. germ. XC. 1.

Dytiscus guttatus. Payk. Fn. Suec. 1. n. 20.
p. 211.

Man

Man streiche alle Citata hinweg, nur *Paykulls* bleibt. Dagegen fällt dieses vom *Fabrizius* bey *Dytisc. fenestrat.* gebrauchte weg. Herrn D. *Illigers* *Dytisc. guttatus* Mag. I. p. 72. — der nun *D. guttulus* von ihm genannt wird, ist von diesem ganz verschieden.

DYTISCUS ATER. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 15.

Dytiscus ater. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 33, p. 264.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 11. p. 259.

DYTISCUS AGILIS. Fn. Inf. germ. XC. 2. Mas.

Dytiscus bilineat. var. Degeer. IV. n. 6. β, p. 228.

Dytiscus agilis. Paykull. Fn. Suec. I. n. 6, p. 197.

DYTISCUS ADSPERSUS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 18. Fem.

Dytiscus adpersus. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 16, p. 161.

Dytiscus agilis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 44, p. 266, Mas.

Dytiscus adpersus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 51. p. 267. Fem.

Herr D. *Illiger* Mag. I. p. 71. u. p. 373. zieht noch den *D. collaris* Paykull Fn. Suec. I. n. 9, p. 200. hieher, den ich nicht genau kenne. Die-
fen

fen *D. agilis* aber habe ich vom Herrn v. *Paykull* selbst erhalten, weshalb ich um so weniger Anstand nehmen konnte, diese Berichtigung hier anzuschließen.

DYTISCUS INAEQUALIS, Fn. Inf. germ. XIV. 8.

Dytiscus maculatus, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 45. p. 266.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 18. p. 262.

DYTISCUS ELEGANS, Fn. Inf. germ. XXIV. 5.

Dytiscus depressus, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 56. p. 268.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 22. p. 265.

Vergl. Illiger Mag. I. p. 77. und n. 56. p. 373. *Fabrizius* erwähnt freylich der Linien auf den Flügeldecken nicht, indessen gedenkt doch ihrer *Paykull* bey f. *depress.* Fn. Suec. I. n. 30. bestimmt, auch sagt derselbe bey f. *alpino* Fn. Suec. I. n. 36. der höchst wahrscheinlich nur als Abänderung hieher gehört: *lineae nigrae interdum valde obsoletae*.

DYTISCUS DORSALIS, Fn. Inf. germ. XIV. 2.

Dytiscus dorsalis, Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 57. p. 269.

Gehört als eine seltene Abänderung, *thorace punctis duobus dorsalibus rufis*, allerdings hieher.

DYTISCVS LITVRATVS. Fn. Inf. germ. XIV. 4.

Dytiscus sexpustulatus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 58. p. 269.

DYTISCVS OBLIQUVS. Fn. Inf. germ. XIV. 6.

Dytiscus obliquus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 69. p. 270.

Diefer *D. obliq.* constituit nach Hrn. D. Illiger, eine eigene Gattung, unter dem Namen *Cnemidorus*, wohin auch *Dytisc. elevatus* Fn. impressus Fabr. und *marginepunctatus* Fn. gehören.

DYTISCVS MARGINEPVNCTATVS. Fn. Inf. germ.
XIV. 10.

Ist eine eigene Art, die nun nach Hrn. D. Illigers schriftlicher Versicherung, nicht mit dem *D. Impressus* Fn. XIV. 7. vereinigt werden kan.

DYTISCVS ARCVATVS. Fn. Inf. germ. XXVI. 1.

Dytiscus arcuatus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 74. p. 271.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 78. als Abänderung des *D. pictus* Fabr. hier erklärt.

DYTISCVS TRIFIDVS. Fn. Inf. germ. XXVI. 2.

Dytiscus geminus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 75. p. 272.

Vergl. Illig. Mag. I. p. 77.

DYTISCVS OBSCVRVS. Fn. Inf. germ. XXVI. 3.

Dytiscus interruptus, Fn. Inf. germ. XXVI. 5.

Dy-

Dytiscus minutus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 72. p. 272.

DYTISCVS COLLARIS. Fn. Inf. germ. XXVI. 4.
ed. I.

Dytiscus reticulatus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 80. p. 273.

Diese Bestimmung (Vergl. Faun. Inf. germ.
XXVI. 4. ed. II.) beftätigt Illig. Mag. I. p. 79.

DYTISCVS CHALCONATVS. Fn. Inf. germ. XXXVIII.
17.

Eine eigene Art: statt *chalconatus*, lese man
chalconotus.

DYTISCVS ELEVATVS. Fn. Inf. germ. XIV. 9.
Ein *Cnemidotus*.

DYTISCVS VOLCKMARI. VII. 4.

Heist bey mir Limnius Volckmari. Zu dieser
neuen Gattung, habe ich noch folgende Arten: *Lim-*
nius Megerlei (der D. Volckmari Catalog. Vienn.)
die *Pimelia pygmaea* Fabr. (ihr *Trox dubius* Faun.)
den *Elophorus cothurnatus* Zenker, und eine die-
sem ähnliche ausländische Art, *Limn. araneolus*, n.
Illiger.

CLERVS SCUTELLARIS. Fn. Inf. germ. XXXVIII.
19.

Illiger Kug. Käf. Pr. I. n. 1. p. 282.

Ist ein *Corynites*.

TILLVS ELONGATVS. Fn. Inf. germ. XLIII. 6.

Tillus elongatus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1.
p. 282.

Ist nach der Versicherung des Hrn. D. Illigers,
nach Hrn. Pfarrer Müllers in Odenbach Erfah-
rungen, nur das *Weibchen*, wozu

LAGRIA ATRA. Fn. Inf. germ. VIII. 9.

Tillus ambulans. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 4.
p. 282.

als das *Männchen* gehört.

TILLVS FILIFORMIS. Fn. Inf. germ. LXVII. 17.

Dasytes linearis. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 11.
p. 73.

NOTOXVS SERRICORNIS. Fn. Inf. germ. XXXI. 17.

Anthicus Rhinoceros. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 3. p. 289.

Herr D. Illiger zweifelt indeß noch, ob der
Fabriz. A. Rhin. hierher gehöre.

NOTOXVS BIPUNCTATVS. Fn. Inf. germ. XXVI. 9.

Anthicus bipunctatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 11. p. 291.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 11. p. 377.

NOTOXVS THORACICVS. Fn. Inf. germ. XXIII. 6.
ed. I.

Anthicus pedestris. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 12.
p. 291.

Diese

Diese richtige Bestimmung (vergl. Fn. Inf. germ. XXIII. 6. ed. II.) bestätigt Herr D. *Illiger* durch die Bemerkung, daß nicht alle Exemplare dieses *Anthic.* an den Vordersehenkeln einen Zahn haben: jedoch gehört als Abänderung hieher:

Notoxus cquestris. Fn. Inf. germ. LXXIV. 8.

NOTOXVS MINUTVS. Fn. Inf. germ. XXIII. 5.

Anthicus minutus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 20.
p. 292.

Die Zweifel über diese Bestimmung, vermehren sich dadurch, daß Herr Prof. *Fabrizius*, ohngeachtet der Einwendung des Herrn D. *Illigers* (Kug. Käf. I. p. 294.) wenn gleich selbst zweifelhaft, dessen *Bryaxis Schneideri* hier anführt. Wenigstens kan diese Art nicht unter den *Anthicis* stehen bleiben.

NOTOXVS CALYCINVS. Fn. Inf. germ. VIII. 3.

Ist höchst wahrscheinlich nur Abänderung des *Anthic. floralis* Fabr. et Fn. Inf. XXIII. 4. und vielleicht nur das andere Geschlecht.

NOTOXVS NECTARINVS. Fn. Inf. germ. XXIII. 7.

Bis izt noch eine eigene, unter *Anthicus* gehörige Art.

NOTOXVS BIFASCIATVS. Fn. Inf. germ. VI. 3.

Dircaea bifasciata. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 5. p. 90.

No-

NOTOXVS DVBIVS. Fn. Inf. germ. XI. 13

Dircaea dubia. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6.
p. 90.

PSELAPHVS IMPRESSVS. Fn. Inf. ger. LXXXIX. 10.

Aehnlich dem *Pselaph. sanguin. Fabr.* jedoch verschieden.

PSELAPHVS MUCRONATVS. Fn. Inf. germ. LXXXIX.
11.

Die *femora postica* sind nicht *apice*, sondern *basi mucronata*, wie ich a. a. O. irrig schrieb. Auch ist dieser *mucro* nichts anders als ein *processus coxae femorum*.

CANTHARIS ABDOMINALIS. Faun. Inf. germ.
LXXXIV. 5.

Wahrscheinlich ist hier eine (jedoch von mir nicht veranlafte) Verwechslung, mit einer übrigens bekannten Art vorgegangen. Kaum kan ich solche für die wahre *C. abdominalis Fabr.* halten, weil dessen Beschreibung so sehr widerspricht. Vielleicht ist sie eher Abänderung von *Cantharis livida Illiger*. Dafs indessen die *abdominalis* also abändern sollte, darüber habe ich keine Erfahrung.

CANTHARIS TRISTIS. Fn. Inf. germ. LXXXIV. 6.

Oder soll diese Figur, die *C. abdominalis Fabric.* vorstellen? wenigstens paßt dessen Beschreibung eher hierauf.

CAN-

CANTHARIS NIVEA. Fn. Inf. germ. LVII. 5.

Cantharis clypeata. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 7.
p. 299.

CANTHARIS BICOLOR. Fn. Inf. germ. XXXIX. 13.

Schäffer Icon. Inf. Ratisb. tab. 16. fig. 15.

Panzer System. Nomencl. der Schäff. Inf.
p. 23.

Vergl. Illiger Kug. Käf. Pr. I. p. 297.

CANTHARIS MELANOCEPHALA. Faun. Inf. germ.
XXXIX. 12.

Scheint bis izt noch eigene Art zu seyn.

DERMESTES MACELLARIUS. Fn. Inf. germ. XL. 9.

Dermestes macellarius. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 4. p. 313.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 4. p. 383. Bey wiederholtem Vergleich dieses, mit dem *D. murinus* F. finde ich, das diese Bestimmung keine Abänderung leiden kan. Er ist nicht *Derm. lanarius* Illig. Mag. I. p. 85. den ich gar wohl kenne. Bey meinem *D. macellarius* ist der ganze Unterleib, so wie die Brust, pechbraun, und keine Spur daran von einem *tomento albofericeo*.

DERMESTES MVRINUS. Fn. Inf. germ. XL. 10.

Dermestes vulpinus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 12. p. 314.

DER-

DERMESTES CATTI. Fn. Inf. germ. XL. 11.

Dermestes murinus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 15. p. 315.

DERMESTES FUNGORVM. Fn. Inf. germ. XXXIX.
14.

Dermestes Lycoperdi. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 17. p. 315.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 17. p. 384.

DERMESTES ADSTRICTOR. Fn. Inf. germ. LXXV.
15.

Dermestes adstrictor. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 24. p. 316.

Throscus adstrictor. Walcken. Faun. parif. I.
p. 199.

Vergl. Entom. Hefte II. p. 113.

DERMESTES SEXDENTATUS. Fn. Inf. germ. XIV. 11.

Dermestes sexdentatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 25. p. 317.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 25. p. 384. Hieher gehört auch *Colydium frumentar*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 11. p. 557. welches eine und die nehmliche Art ist.

DERMESTES LUNATUS. Fn. Inf. germ. LXXV. 4.

Dermestes lunatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 26. p. 317.

DERMESTES UNIDENTATUS. Fn. Inf. germ. III. 6.

Dermestes unidentatus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 27. p. 384.

DERMESTES RUFITARSIS. Fn. Inf. germ. XXXV. 6.

Dermestes nigripes. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 29. p. 318.

Vergl. Illig. Kug. Käf. Pr. I. p. 318.

DERMESTES PICIPES. Fn. Inf. germ. XIV. 12.

Dermestes obscurus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 30. p. 318.

DERMESTES SCANICVS. Fn. Inf. germ. IV. 9.

Engis humeralis. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 2.
p. 583.

DERMESTES VINI. Fn. Inf. germ. XL. 14.

Dermestes cellaris. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 40.
p. 319.

Ist nichts; anders, als der eben genannte *D. cellaris*, wie mich ein wiederholter Vergleich dieses mit dem wahren *D. cellaris F.* belehrte. Allerdings ist vor der Mitte des Seitenrandes am Halschilde, noch ein kleines Zähnnchen, das beym Zeichnen übersehen worden ist.

DERMESTES TOMENTOSVS. Fn. Inf. germ. XL. 12.

Dermestes tomentosus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 22. p. 316,

E

Diese

Diese Figur, wiewohl nicht nur von den Illuministen verdorben, sondern auch in der Originalmahlerey ganz verfehlt, soll nichts destoweniger, *nur diesen D. tomentosus Fabr. und sonst keinen andern Käfer vorstellen.* Das nehmliche Exemplar, nach welchem diese Zeichnung gefertigt worden ist, conservire ich noch in meiner Sammlung unter Nr. 1144. womit auch die Sturmische Originalmahlerey, zum Beweifs, daß keine Verwechslung vorgehen konnte, von dessen eigener Hand, noch bezeichnet ist. Ich werde indeffen, um diesen Umstand ganz zu berichtigen, in dem 97ten Hefte meiner Faune, eine wiederholte Zeichnung dieses Derm. tomentos. Fabr. vorzulegen nicht unterlassen. Dieses Citat fällt demnach bey *Melyris pallipes Illig. Mag. I. p. 83.* hinweg.

DERMESTES QVADRIPIVSTVLATVS. Faun. Inf. germ.
VI. 6.

Engis sanguinicollis. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 5. p. 584.

DERMESTES PORCATVS. Fn. Inf. germ. XXIII. 8.
Lathridius scabratus. Illig.

Vom *Lathr. Herbst* u. *Kugel.* ganz verschieden.
Herr D. *Illiger* nennt ihn nun *Lathridius scabratus.*

DERMESTES ATER. Fn. Inf. germ. XXIII. 9. ed. I.

Dermestes fimetarii. Fn. Inf. germ. XXIII. 10. ed. II.

Cryptophagus fuscus. Knoch.

Er ist nicht *Catheretes ater* Herbst. Nach Hrn. D. Illiger, führt er nun den Namen *Cryptophagus fuscus* Knoch.

DERMESTES SEMICOLEOPTRATUS. Faun. Inf. germ. XXIV. 6.

Ist kein *Catheretes*, auch nicht das *Weibchen* des *C. pedicularius*, sondern eine Abänderung der *Silph. melanocephal.* Fn. Inf. germ. XXV. 5.

DERMESTES VIOLACEUS. Fn. Inf. germ. V. 6.

Corynites violaceus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 285.

Hierher gehört allerdings Schäffer Ic. Inf. ratisb. tab. 166. fig. 4. a. b. Vergl. meine *systematische Nomenclat. der Schöff. Inf.* p. 152.

DERMESTES BIMACULATUS. Fn. Inf. germ. LVII. 7.

Ein *Cryptophagus*, und eine sehr distinct ausgezeichnete Art.

DERMESTES LONGICORNIS. Fn. Inf. germ. XXIII. 10. ed. I.

Dermestes fenestralis. Faun. Inf. germ. XXIII. 11. ed. II.

Dermestes fenestralis. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 37. p. 318.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 37. p. 385.

[*ANOBIUM RETICULATUM*. Fn. Inf. germ. XXXV. 7.
Anobium reticulatum. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 3. p. 322.

[*ANOBIUM MICANS*. Fn. Inf. germ. X. 8.
Anobium micans. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 14.
p. 324.

Hicher gehört auch:

Anobium festivum. Fn. Inf. germ. VI. 7.

[*ANOBIUM NITIDUM*. Fn. Inf. germ. X. 9.
Anobium nitidum. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 15.
p. 324.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 15. p. 387.

[*ANOBIUM DENTICOLLE*. Fn. Inf. germ. XXXV. 8.
Ist eine eigene Art.

[*ANOBIUM DORCATOMA*. Fn. Inf. germ. XXVI. 10.
ed. II.

Dermestes ferra. Fn. Inf. germ. XXVI. 10.
ed. I.

Dorcatoma dresdense. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 1. p. 330.

Ent. Hefte II. p. 96. tab. III. fig. 10.

Es ist noch die Frage, ob das *Anobium Dorcatoma Illigeri*, welches gewis der hier abgebildete

Käfer

Käfer ist, (denn *Derm. Serra*, wie ich anfangs glaubte, ist es nicht) der nehmliche sey, den *Fabrizius* unten *Ptilinus dorcatoma* suppl. *Ent. syst.* p. 73. beschrieben, und den die *Verf. der entom. Hefte* abgebildet haben. Man vergleiche beider Beschreibungen, mit Herrn D. *Illigers* Beschr. des *Anob. dorcatom.* Kug. Käf. Pr. I. p. 334. und dieser meiner Abbildung.

PTINUS SEXPVNCTATUS. Fn. Inf. germ. I. 20.

Ist wohl doch nicht eigene Art. Eher eine Abänderung des *Männchens*, oder das noch ganz unvermischte Männchen selbst von *Ptinus* für *F.* wohin auch *Schäffer* Ic. Inf. ratisb. tab. 155. fig. 3, a. zu gehören scheint.

HISPA MUTICA. Fn. Inf. germ. I. 8. ed. I.

Ptilinus muticus. Fn. Inf. germ. I. 8. ed. II.

Sarrotrium muticum. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 327.

PTILINUS ATER. Fn. Inf. germ. XXXV. 9.

Ptilinus ferratus. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 5. p. 330.

PARNUS AVRICVLATUS. Fn. Inf. germ. XXXVIII. 23.

Eine standhaft verschiedene Art. In der Abbildung sind die Fühlhörner falsch, die wie am *Pern. prolifericornis* Fabr. und Fn. Inf. XIII. 1. gebildet sind. *Illiger.*

SILPHA RUGOSA. Fn. Inf. germ. V. 9.

Silpha reticulata. Fabric. Syst. Eleuth. 1. n. 18.
p. 341.

Die richtigere *S. rugosa* ist Fn. Inf. XL. 17,
abgebildet.

SILPHA MELANOCEPHALA. Fn. Inf. germ. XXV. 5.

Ist nicht *S. minuta* Fabr. weswegen dieses Citat
selbst hinwegfällt, wie bereits vom H. Illig. im
Mag. I. p. 392. sehr richtig erinnert worden ist.

SILPHA HEMIPTERA. Fn. Inf. germ. XXV. 6.

Ist eine eigene Art.

NITIDULA BILOBA. Fn. Inf. germ. XXXV. 10.

Nitidula marginata. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 6. p. 348.

NITIDULA DISCOIDES. Fn. Inf. germ. LXXXIII. 5.

Nitidula discoides. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 23. p. 352.

Ist keineswegs Abänderung der *Nit. haemorrhoid.* F. sondern eigene Art.

NITIDULA PUNCTATISSIMA. Fn. Inf. germ. XXV. 7.

Ist eine eigene Art.

HETERO CERUS MARGINATUS. Fn. Inf. germ. XXIII.

. cd. II.

Heterocerus laevigatus. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 3. p. 356.

HETE-

HETEROCERVUS LAEVIGATUS. Fn. Inf. germ. XXIII.
13. ed. II.

Heterocerus marginatus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 1. p. 355.

COCCINELLA ARGVS. Fn. Inf. germ. LXXIX. 4.

Coccinella undecimmaculata. Fabric. Syft.
Eleuth. I. n. 67. p. 367.

COCCINELLA SCYMNVS QVADRIPIVSTVLATVS. Fn.
Inf. germ. XXIV. 8. ed. I.

Coccinella bisbiverrucata. Fn. Inf. germ. XXIV. 8.
ed. II.

Coccinella bisbipustulata. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 139. p. 382.

und zwar die var. β . *capite nigro, thorace utrin-*
que puncto rubro. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 6.
p. 415.

COCCINELLA SCYMNVS BIPVSTVLATVS. Fn. Inf.
germ. XXIV. 10. ed. I.

Coccinella humeralis. Fn. Inf. germ. XXIV. 10.
ed. II.

Coccinella frontalis. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 133. p. 381.

Coccinella frontalis var. δ . Illiger Kug. Käf.
Pr. I. n. 8. p. 418.

COCCINELLA SCYMNVS NIGRINVS. Fn. Inf. germ.
XXIV. 12. ed. I.

Cocci-

Coccinella nigrina. Fn. Inf. germ. XXIV. 12.
ed. II.

Coccinella nigrina. Illiger Kug. Käf. Pr. I.
n. 1. p. 413.

COCCINELLA BISBIPVSTVLATA. Fn. Inf. germ.
XIII. 5.

Coccinella quadrilunulata. Illiger Kug. Käf.
Pr. I. n. 7. p. 417.

Sphaeridium quadrimaculatum. Herbst Archiv
IV. n. 6. p. 30. tab. 20. fig. 9.

Ich werde vielleicht nicht sehr irren, wenn
ich unter dieser Bestimmung, den hier abgebil-
den Käfer erkenne. Mehr, die etwas anders be-
schriebene Lage und Direktion der Flecken, als
die verschiedene Gröfse, erregen indessen den-
noch Zweifel.

COCCINELLA AVRORA. Fn. Inf. germ. XXXV. 5.

Nitidula litura. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 27.
p. 353.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 27. p. 394.

COCCINELLA AREATA. Fn. Inf. germ. XXIV. 7.

Halte ich immer noch für eine eigene Art. Mir
ist sie seitdem nicht wieder vorgekommen.

COCCINELLA PVESCENS. Fn. Inf. germ. XXIV. 13.

Führe ich auch gegenwärtig noch als eigene
Art auf: wenigstens ist mir keine bekannt, an
die sie sich schicklich anreihen liesse.

CASSIDA THORACICA. Fn. Inf. germ. XXXVIII.

24.

Cassida thoracica. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2.

p. 388.

Cassida thoracica. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 3.

p. 478.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 2. p. 404.

CASSIDA PVLCELLA. Fn. Inf. germ. XXXIX. 15.

Cassida nobilis. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 47.

p. 396.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 47. p. 407.

CHRYSOMELA PRETIOSA. Faun. Inf. germ. XLIV.

13.

Eumolpus pretiosus. Fabric. Syft. Eleuth. I.

n. 5. p. 419.

CHRYSOMELA GEMELLATA. Fn. Inf. germ. XLIV. 6.

Chrysomela bicolor. Fabric. Syft. Eleuth. I.

n. 39. p. 429.

Vergl. Illig. Mag. I. n. 39. p. 411.

CHRYSOMELA HAEMOPTERA. Faun. Inf. germ.

XLIV. 7.

Chrysomela tristis. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 62.

p. 433.

CHRYSOMELA COLLARIS. Fn. Inf. germ.

LXXVIII. 2.

Chry-

Chrysomela collaris. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 8. p. 435.

Schäff. Ic. Inf. ratisb. tab. 52. fig. 11. 12. ist *Clytra aurita* Fabric. und tab. 173. fig. 4. a. b. ist *Chrysomela Salicis* Fabric. Vergl. meine *system. Nomenclat. der Schäff. Inf.* p. 70. und p. 157.

CHRYSOMELA ALTERNANS. Fn. Inf. germ. LXVII.
16.

Chrysomela Megerlei. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 106. p. 439.

Vergl. *Illig. Mag.* I. n. 106. p. 414.

CHRYSOMELA SPECIOSA. Fn. Inf. germ. XXIII. 15.
nur Abänderung von:

Chrysomela gloriosa. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 111. p. 440.

Chrysomela gloriosa. Fn. Inf. germ. XXIII. 14.
iedoch gehört Schäff. Ic. Inf. ratisb. tab. 21.
fig. 8. nicht hieher. Vergl. meine *system. Nomencl. der Schäff. Inf.* p. 31.

CHRYSOMELA CARNIFEX. Fn. Inf. germ. XVI. 9.

Chrysomela sanguinolenta. Roff. Fn. Etrusc. I.
n. 194. p. 77.

Geoffr. Inf. I. n. 8. p. 259.

Chrysomela Rossia Illiger.

Die *Chrysom. Carnifex* Fabric., welche er uns
selbst bestimmt hat, ist eine länglichte. Die hier
abge-

abgebildete, ist entweder unsere *Rossia*, oder eine andere noch unbeschriebene Art, *fimbriata nobis*, deren Halschild doch etwas breiter, und mehr gleichbreit ist, als in der Abbildung. Illiger.

Ich wählte demnach obige Benennung eher, da ich die *fimbriata* Illig. nicht kenne.

CHRYSOMELA BAADERI. Fn. Inf. germ. XXIV. 14.
et LIX. 2.

ist nur Abänderung von

Chrysomela viminalis. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 83. p. 436.

Chrysomela viminalis. Fn. Inf. germ. LXXVIII. 3.

CHRYSOMELA BECCABUNGAE. Fn. Inf. germ. XXV.
11.

Helodes violacea. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 3.
p. 470.

Um die Uebersicht der hier nun vorkommenden und zu berichtigenden *Alticar.* zu erleichtern, lasse ich solche nach dem Vorgange, mehrerer einsichtsvollen Entomologen, hier ungetrennt aufeinander folgen.

ALTICA NAPI. Fn. Inf. germ. XXI. 3.

Chrysomela chrysocephala. Linn. Syst. Nat. n. 53.
p. 594.

Altica Chrysocephala. Ent. Heft. II. n. 13. p. 31.
Tab. II. fig. 8. a. b.

Bey

Bey wiederholter genauern Untersuchung dieses hier vorgestellten Käfers, zeigte es sich, daß die *Verf. der Entom. Hefte*, sehr richtig beobachtet haben, und daß meine *Altica Napi* nicht die des Systems seye, dagegen unfreilich unter angezeigten Benennungen von denselben abgebildet und beschrieben, wie dies nicht nur die ansehnlichere Gröfse, in Bezug auf die wahre *Altica Napi Fabr.*, sondern auch das so charakteristische hiemit zu vereinpaarende Merkmal des gelben Gesichts zu erkennen gab.

ALTICA HYOSCYAMI. Fn. Inf. germ. XXI. 4.

Chrysomela Hyoscyami. Fabric. Syst. Eleuth. I.

n. 149. p. 447. exclus. Syn. Payk. et Geoffr.

Geoffr. I. n. 12. p. 149.

Altica caerulea. Ent. Hest. II. n. 31. p. 55.

Die *Verf. der Entom. Hefte* beschreiben, und bilden a. a. O. einen Käfer ab, den sie *Altic. Hyoscyami* nennen, und für die *Chrysom. Hyoscyami* Linn. halten, und von dem sie meine *Alt. hyoscyami* zu trennen suchen. So gerne ich aber einräume, daß meine *hyoscyami*, unter ihrer *caerulea*, so wie von Payk. Fn. Suec. II. n. 15. p. 97. richtig charakterisirt worden seye, so wenig kan ich mich überzeugen, daß ihre *hyoscyami*, diejenige seye, die Linné unter der seignigen verstanden habe. Es ist kaum glaublich, daß

dafs *Linné* eine folche messingfarbige *Altica*, *totam caeruleam*, *corpore virescenti coeruleo*, und *ovatam caeruleam* *Fn. Suec. n. 536.* genannt haben würde. Bekanntlich variiren diese kleinen *Altica* aus dem blauen öfters in das grünlichte, aber eine und die nehmliche Art nicht in das messingfarbige.

Wenn gleich die *Verf.* nur ihre *Altica hyoscyami* auf dem Bilsenkraute fanden, die meinige aber nicht, so würde doch dieser Umstand kaum viel beweisen, indeme man als bekannt voraussetzen darf, dafs *Linné* so manche Insekten, in Schweden, auf Gewächsen antraf, auf welchen wir sie in Süddeutschland nicht finden. Uebrigens kan es möglich seyn, dafs *Linné* unter seiner *hyoscyami tota caerulea* eine andere vor sich hatte, als die ich hier abgebildet, doch wenigstens die *hyoscyami* der *Verf.* gewis nicht. Von dem *Fabrizischen* Citate abzugehen, fand ich keine Ursache.

ALTICA NIGRIPES. *Fn. Inf. germ. XXI. 5.*

Chrysomela nigripes. *Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 150. p. 447.*

Altica Lepidii. *Ent. Heft. II. n. 39. p. 64.*

Die *Verf. der Entom. Hefte* halten meine *Alt. nigripes*, nicht für die gleichnamige *Fabrizische*, weil *Fabrizius* in der *Ent. syst. II. p. 30.* sagt:
distin.

distincta ab. *G. Hyoscyami pedibus nigris* — mit der sie (*die nigripes*) sich doch nicht vergleichen liesse. Jedoch verglich *Fabrizius* seine *Galleruca nigripes* nicht mit derienigen *hyoscyami*, welche die *Verf.* dafür annehmen, sondern mit einer Art, welche, um diesen Vergleich auszuhalten, seiner *nigripes* sehr ähnlich seyn müßte. Diese wäre doch wohl sehr wahrscheinlich alsdann meine *Altica hyoscyami*.

ALTICA HELXINES. Fn. Inf. germ. XXI. 6.

Chrysomela Helxines. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 152. p. 447.

Ist eine von den am meisten übelgerathenen Figuren in der Fn. Inf. Kaum dafs man in ihr eine *Altica* erkennt. Ich werde solche künftig nochmals vorstellen lassen.

ALTICA MODEERI. Fn. Inf. germ. XXI. 7.

Chrysomela Modeeri. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 155. p. 448.

Altica Modeeri. Ent. Heft. II. n. 24. p. 47.

ALTICA TESTACEA. Fn. Inf. germ. XXI. 13.]

Chrysomela testacea. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 159. p. 448.

Altica testacea. Ent. Heft. II. n. 27. p. 50.

ALTICA RVFIPES. Fn. Inf. germ. XXI. 10.

Crioceris fulvipes. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 68. p. 463.

Altica fuscicornis. Ent. Heft. II. n. 28. p. 51.

Nach der Meinung der *Verf. der Entom. Hefte* gehört *Chrysom. fuscicornis* Linn. S. N. n. 66. hierher. Nur sagt Linné: paullo maior; nemlich, als seine *Chrysom. rufipes* n. 65. oder meine *Altica ruficornis*, das den Gedanken erregt, Linné müfse keine sehr grofsen Exemplare von seiner *Chr. fuscicornis* gesehen haben, deren es doch gibt, und die noch gröfser find, als selbst das auf Tab. 13. Fn. angegebene Gröfsenmaafs, ganz einstimmig, mit der *Verf.* eigenen Angabe, von $1\frac{1}{2}$ bis 2 Linien: auch sagt Linné: nec antennae luteae; aber auch dies trifft kaum zur Helfte zu: die ersten fünf Gelenke geht dies nur an: nicht minder erregt das *simillima rufipedi*, doch auch einige Bedenklichkeiten. Linné hat auch diese *Chrysom. fuscicornis* zu kurz behandelt, um mit voller Evidenz zu entscheiden. Indessen gehört solche doch weit eher hierher, als zur *Crioc. ruficorn.* Fabric.

In den Ent. Heften mufs bey dieser *Alt. fuscicornis* n. 28. statt *Crioceris fulvicornis* Fab. Syst. Eleuth. I. 465. — *Crioceris fulvipes* Fab. Syst. Eleuth. I. 463. gelesen werden.

ALTICA FUSCIPES. Fn. Inf. germ. XXI. 11.

Crioceris fuscipes. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 69.
p. 464.

Altica fuscipes. Ent. Heft. II. n. 1. p. 10.

Die Punktreihen auf den Flügeldecken, sind gegen hinten zu, nicht mehr so regelmässig, wie an ihrem Entstehen, worauf das *punctis subdispersis*, Ent. H. l. c. sehr treffend anspricht. Fabricius sagt: *affinis praecedenti, et forte eius varietas*, welches seyn dürfte, wenn man annehmen kan, dass die Verf. der Ent. Hefte, und ich einen ganz andern Käfer, als *diese fuscipes*, vor sich gehabt hätten.

ALTICA RUFICORNIS. Fn. Inf. germ. XXI. 12.

Crioceris ruficornis. Fabric. Syst. Eleuth. I.
n. 70. p. 464.

Altica rufipes. Ent. Heft. II. n. 2. p. 11.

Der Quereindruck auf dem Bruststücke, den die Verf. d. Ent. Hefte zu einem charakterisirenden Umstand bey diesem Flohkäfer erheben, muss indessen bey manchen Exemplaren doch sich sehr abflächen, wenigstens bemerke ich solchen nicht in den beschriebenen Stücken. Nur sind die am Hinterrande des Halschildes stehenden beyden Grübchen deutlich. Wenn angenommen werden dürfe, dass die *Altica rufipes* Fn. auch mit *rothen Füßen* abändern könne, woran es mir jedoch ganz

ganz an Erfahrung gebricht, um diese kühne Idee zu verfolgen, so würde ich mich überzeugen, daß *Altica ruficorn.* Fn. nur Spielart der gedachten rufip. seye: so ähnlich sind meine Exempl. beyder Arten, einander.

CRIOCERIS QUADRIPUSTULATA. Faun. Inf. germ.
LXXXVIII. 2.

Crioceris quadripustulata. Fabric. Syst.
Eleuth. I. n. 72. p. 464.

Altica quadripustulata. Ent. Hest. I. n. 43. p. 73.

Die *Crioceris quadripustulata* Fabr. soll, besage des *System. Ent.* n. 13. p. 114, woselbst solche zuerst als *Altica quadripustulata* aufgeführt worden ist, *magnitudinem Alt. rufiped.* (Fn. XXI. 10. *Alt. fuscicorn.* Ent. Hest II. n. 28.) haben; allein diese Gröfse hat weder die *Alt. quadripust. der Ent. Hefte*, noch meine *C. quadripust.*, aber das vom *Geoffr.* I. n. 15. p. 250. von dem solche *Fabrizius* zuerst entlehnte, angegebene Gröfsenmaafs; von $1\frac{1}{2}$ Linien trifft zu. Ferner sagt *Fabrizius* a. a. O. *punctum alterum elytrorum ad basin, alterum versus apicem*; aber weder der *Verf. der Ent. Hefte*, noch mein Käfer, haben *puncta* (wiewohl *Fabrizius* solche nachgehends in der *Ent. Syst.* II. n. 93. in *lineolas* verwandelt), eben so wenig als *lineolas*. Beider Käfer farbichte Flügeldecken Zeichnungen müfste man *maculae* nennen.

nen. Solchemnach dürfte diese *Fabriziusche Altica*, weder die meinige noch jene in den *Ent. Heften* beschriebene und abgebildete seyn. Aber auch unsere beiden Käfer sind sich sehr ungleich; dieß gibt schon die Ansicht beider Abbildungen zu erkennen. Mein Käfer hat auf ieder Flügeldecke zwey dunkelrothrothe länglichtrunde *Flecken*, deren einer hart an der Schulter, (nicht als *lineola discoidalis*, wie Paykull Fn. Suec. II. n. 18. p. 99. will) und der andere, in einiger Entfernung von den Endspitzen liegt: da hingegen diese Flecken, bey der *Alt. quadripustul. der V. tab. III. fig. 5.* nicht nur ganz anders situiert, sondern von Farbe, *weißlicht* oder *bleich* (*albidac, pallidae*) sind, ob sie gleich *fulvae*, und *röthlich* gelb von den *Verf.* genennet werden.

Die Gröfse des Paykullfchen Käfer a. a. O. soll *duplo minor praecedente* (nehmlich *Alt. nemor.*) seyn: meine Exemplare der *Crioc. quadripust. Fn.* die ich in großer Anzahl jährlich auf *Cynogloss. officinal. Linn.* finde, haben die Gröfse, mit der *Alt. nemor.* gemein.

Ich kan daher kaum glauben, daß ich die alte *Altica quadripust. Fabr.* oder diese izige *Crioc. quadripust.* abgebildet habe; noch weniger; daß die *Alt. quadripustul. der Entom. Hefte*, mit dem *Fabriz.* eben genannten Käfer, noch mit meinem

ver-

verglichen werden könne. Meiner Meinung nach sind hier drey verschiedene Arten zur Sprache gebracht:

1. *Crioceris quadripustulat.* Fabr. l. c. wohin Geoffr. I. n. 15. p. 250. gehört.
2. *Altica quadripustulata* Ent. Heft. I. l. c. wohin
Galler. *quadripustul.* Paykull. l. c. gehört.
3. *Crioceris quadripustul.* Fn. Inf. germ. l. c. wozu ich bis izt kein Synonym kenne.

Noch muß ich bemerken, daß an alten Exempl. meiner *Crioc. quadripust.* die *antennae* nur basi flavescens sind, ob sie gleich in der Abbildung, irrig, ganz gelblicht illuminirt worden.

ALTICA NASTURTI. Fn. Inf. germ. XXI. 9. exclus. Syn. Fabric.

Altica flexuosa var. a. Entom. Heft. II. n. 42. p. 71.

Mit dieser verbinden die achtungswürdigen Verf. der Ent. Hefte sehr zweckmäfsig, und wie ich glaube, ganz mit Einverständniß der Natur selbst, die

Altica flexuosa. Fn. Inf. germ. XXV. 12.

Altica flexuosa var. b. Ent. Heft. II. n. 42. p. 71.

Nur fällt ihre var. c. *Altica flexuosa* Hellw. darum hinweg, weil solche die nehmliche hier

abgebildete *Altica flexuosa* Fn. et var. b. ist, die mir vom Herrn Prof. Hellwig hiezu mitgetheilt, und die vorher vom Herrn D. Illiger, in dem angeführten *Schneiderschen* Mag. V. 8. 601. beschrieben worden ist. So nach würden sonst aus einer — zwey entstehen!

ALTICA ATRICILLA. Fn. Inf, germ. XXI. 8.

Altica affinis. Ent. Hest. II. n. 16. p. 35.

Chrysomela exoleta. Linn. Syft. Nat. n. 59. p. 594. et Fn. Succ. n. 541.

Auffer der Differenz, des vom *Linné* in der Fn. Succ. gebrauchten *saltatoria flavescens*, und des im Syft. Nat. nachher umgetauschten *saltatoria livida*, die sich wohl vereinbaren läßt, sehe ich keinen Grund ab, mit *Paykull* Fn. Succ. II. p. 109. zu behaupten, daß *Linné* zwey ganz verschiedene Arten, so überaus oberflächlich angenommen und distinguirt haben sollte. Nur die *Crioceris exoleta* *Fabric.* gehört nicht hieher, wie schon *Illiger* Mag. I. p. 420. sehr richtig bemerkt hat, denn diese ist folgende:

ALTICA EXOLETA. Fn. Inf. germ. XXI. 14.

Crioceris exoleta. *Fabric.* Syft. Eleuth. I. n. 80. p. 466. *exclus.* *Syn.* *Linn.*

Altica exoleta. Ent. Hest. II. n. 5. p. 17. *exclus.* *Syn.*

ALTIS

ALTICA TABIDA. Fn. Inf. germ. XXI. 15.

Crioceris tabida. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 86.
p. 467.

Vergl. *Ent. Hefte II.* n. 49. p. 86. wofelbst diese tabida Fn. (warum nicht auch tabida Fabric.?) für eine bloſſe *Spielart* der Chryſom. atricill. Linn. erklärt wird, und wie ich glaube mit Recht.

ALTICA NEMORVM. Fn. Inf. germ. XXI. 19.

Crioceris nemorum. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 89. p. 467.

Altica nemorum. Ent. Heft. II. n. 41. p. 70.

ALTICA BRASSICAE. Fn. Inf. germ. XXI. 18.

Altica Spartii. Ent. Heft. II. n. 45. p. 76.

Die achtungswürdigen Verf. der *Ent. Hefte* urtheilen nur zu richtig, daß dieſer Käfer keineswegs unter die Alticas gehören könne, und zur vollkommenen Beſtätigung Ihres Urtheiles, laſſe ich hier Herrn D. Illiger, nach dem mir hierüber gefälligſt mitgetheilten, ſelbſt ſprechen:

Die *Altica Brassicae* Fn. &c. iſt unfere *Galleruca futurella*, die wir aus Süddeutſchland und Ungarn bekommen haben; und wovon *Crioceris pinicola* Anderſch. Catalog. vienn. nur Abänderung zu ſeyn ſcheint. In den Entom. Heften iſt dieſer Käfer als *Haltica Spartii* II. 76. 45. beſchrieben. Da er aber
keine

keine *Haltica* ist, sondern zu der Familie von *Galleruca* gehört, welche *Fabrizius Crioceris* nennt, so ist unser schon lang gegebener Name, wohl besser. Die Citate des *Fabrizius* (nehmlich in der Fn.) sind falsch. Die *Alt. Brassicae Fabr.* ist ein sehr verschieden gezeichnetes kleines Käferchen.

ALTICA PRATENSIS. Fn. Inf. germ. XXI. 16.

Geoffr. Inf. I. 19. p. 251.

Altica pratensis. Ent. Hest. II. n. 50. p. 88.

Hiemit scheinen auch die Verf. dieser *Entom. Hefte*, die *Crioceris Nasturtii Fabric.* verbinden zu wollen, die wie nun ersichtlich, nicht die von mir Fn. Inf. XXI. 9. vorgestellte ist, und theilen von derselben Tab. III. fig. 9. eine sehr vorzügliche Zeichnung mit. Es kan seyn, das diese *nasturtii* nach einer von mir noch nicht beobachteten Stufenfolge, aus dieser *pratensis* *Ent. Hefte* entstehen könne, nur glaube ich kaum, das meine sich so sehr in Bau, und Umriss des Körpers und Farbe auszeichnende *pratensis*, mit iener vereint werden könne, vielmehr, da ihr mehrere an der *pratensis* prätendirte Eigenheiten, wie — pechschwarze Hintersehenkel fehlen, von derselben entfernt gehalten werden mögte.

ALTICA VERBASCI. Fn. Inf. germ. XXI. 17.

Vergl. *Ent. Hefte II.* n. 48. p. 84. woselbst diese Verbasci mit Crioc. Sifymbrii *Fabr.* zu vereinigen versucht wird. Diefs wird aber wohl nicht füglich angehen können, da mich ein wiederholter Vergleich, mit dem vom Herrn Prof. *Hellwig* selbst gefälligst mitgetheilten Exemplare, und mit der noch bestehenden *Fabriz.* Beschreib. fattsam überzeugt, dafs selbige nicht auf gegenwärtige Verbasci gedeutet werden kan, wofür diese gut gerathene nur zu lebhaft ausgefallene Abbildung selbst das Wort spricht: ausserdem Herr D. *Illiger*, den ich um sein Gutachten hierüber gefragt, noch immer der ältern hellwigischen Distinktion, getreu zu bleiben, angerathen.

ALTICA GRAMINIS. Fn. Inf. germ. LXI. 4.

Altica Graminis. Ent. Heft. II. n. 25. p. 47.

ALTICA ORBICVLATA. Fn. Inf. germ. VIII. 6.

Gehört nicht unter Altica, sondern unter Cyphon, und bestimmt eine eigene mit dem Cyph. hemisph. F. Faun. XCVI. 7. nicht zu verwechselnde Art.

ALTICA GLOBOSA. Fn. Inf. germ. XXV. 13.

Bestätigt sich als eigene Art.

ALTI-

ALTICA ERVCAE. Fn. Inf. germ. XXI. 2.

Ist, wie die genau beobachtenden Verf. der *Ent. Hefte II.* p. 55. bereits sehr richtig bemerkt haben, nur die (übelgerathene) Chrysomela Cochleariae Fabric. welche Fn. Inf. XLIV. 15. nochmals, jedoch um vieles besser, vorkommt.

CRIOCERIS GLABRATA. Fn. Inf. germ. XXXIV. 6.

Crioceris glabrata. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 28. p. 455.

Vergl. *Illig.* Mag. I. p. 418. 419. woselbst solche für eine Abänderung der Crioc. Cerasi, oder fulvicollis gehalten wird.

CRIOCERIS FVLVICOLLIS. Fn. Inf. germ.

LXXXIII. 8.

Crioceris Cerasi. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 30. p. 56.

Vergl. *Illig.* Mag. I. n. 30. p. 418.

CRIOCERIS LINEOLA. Fn. Inf. germ. XXXIV. 5.

Crioceris lineola. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 62. p. 462.

Auch diese wird a. a. O. von Herrn D. *Illiger* für eine bloße Spielart der Crioc. Cerasi erklärt. — Auf einer eingezäunten tief liegenden Waldwiese, die durch einen vorbeystießenden Waldstrom immer feucht erhalten wird, finde ich jährlich die *Crioceris Cerasi* Fabr. auf *Chaeroph. sylve-*

fylvestre u. hirsut. Linn. in großer Menge: aber auch nicht *einmal* noch, traf ich die darunter gerechneten Varietäten Crioc. glabrata und lineola, unter selbiger an. —

CRIOCERIS PHELLANDRYI. Fn. Inf. germ. LXXXIII. 9.

Helodes Phellandryi. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1. p. 469.

CRIOCERIS CAMPESTRIS. Fn. Inf. germ. III. 12.

Helodes campestris. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 2. p. 470.

Ich bitte hierüber nachzulesen: Voet etc. IV Th. p. 22. meiner Ausgabe.

CRIOCERIS MERDIGERA. Fn. Inf. germ. XLV. 2.

Lema merdigera. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 9. p. 472.

CRIOCERIS BRUNNEA. Fn. Inf. germ. XLV. 1.

Lema brunnea. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 11. p. 473.

CRIOCERIS DUODECIMPUNCTATA. Fn. Inf. germ. XLV. 3.

Lema duodecimpunctata. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 12. p. 473.

CRIOCERIS QUATVORDECIMPUNCTATA. Faun. Inf. germ. XLV. 4.

Lema quatuordecimpunctata. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 14. p. 473.

CRIOC-

CRIOCERIS BIMACULATA. Fn. Inf. germ. XLVIII. 16.

Galleruca quadrimaculata. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 36. p. 485.

CISTELA FUSCA. Fn. Inf. germ. XXV. 19.

Cistela rufipes. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 12. p. 19.

CISTELA RUBRICOLLIS. Fn. Inf. germ. XXXIV. 9.

Cistela thoracica. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 16. p. 19.

CISTELA BIPUSTULATA. Fn. Inf. germ. XXV. 15.

Cistela humeralis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 18. p. 19.

CISTELA BREVIS. Fn. Inf. germ. XXV. 17.

Cistela maura. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 21. p. 20.

wohin auch *Helops picipes* Faun. Inf. germ. XXIV. 4. als Abänderung gehört.

CISTELA HUMERALIS. Fn. Inf. germ. XXV. 14.

Cistela scapularis. Illig.

Ich halte die von mir im Schneid. Mag. und von Ihnen Fn. Inf. 25. 15. beschriebene *Cistela bipustulata* für die wahre *Cist. humeralis* Fabric. Ist dies richtig, so muß ihre *C. humeralis* den Namen annehmen, den wir ihr in unserer Sammlung ertheilt haben, *Cistela scapularis.* Illiger.

CISTE-

CISTELA LINEARIS. Fn. Inf. germ. XXV. 16.

Ist eine eigene Art.

CISTELA OPACA. Fn. Inf. germ. XXV. 18.

Allecula Morio. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 1.
p. 21.

Vergl. *Allecula Morio* Fn. Inf. germ. XCV. 1.
Die nehmliche Art, nur aus Versehen nochmals
abgebildet.

CISTELA ANTENNATA. Fn. Inf. germ. LVII. 8.

Mir bis izt noch eine eigne Art.

CISTELA LAETA. Fn. Inf. germ. VIII. 8.

Cyphon pallidus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 1.
p. 501.

CISTELA FALLIDA. Fn. Inf. germ. VIII. 7.

Cyphon lividus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 2.
p. 501.

CISTELA NIMBATA. Faun. Inf. germ. XXIV. 15.

Cyphon marginatus. Fabric. Syft. Eleuth. I.
n. 5. p. 502.

CLYTHRA HUMERALIS. Fn. Inf. germ. XLVIII. 13.

Clythra tridentata. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 27. p. 34.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 77. fig. 5.

Vergl. meine *system. Nomencl. der Schöff. Inf.*
n. 5. p. 92.

CLY-

CLYTHRA LONGIMANA. Fn. Inf. germ. XLVIII. 14.

Chrysomela tridentata. Linn. Syst. Nat. n. 73. p. 596.

Schäffer Ic. Inf. Ratisb. tab. 36. fig. 13.

Vergl. Illig. Mag. III. n. 27. p. 164. und meine
system. Nomenclat. der Schöff. Inf. n. 13. p. 52.

CLYTHRA TRIDENTATA. Fn. Inf. germ. XLV II. 12.

Clythra longimana. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 40. p. 37.

Vergl. Illig. Mag. III. n. 40. p. 165.

CLYTHRA SCOPOLINA. Fn. Inf. germ. XLVIII. 15.

Vergl. Illig. Mag. III. n. 38. p. 164. nach welchem diese Clythra Scopolina für die Chrysomela quadrimaculata Linn. erklärt, und demnach von Clythra Scopolina und Clythra quadrimaculata Fabric. für verschieden gehalten wird. Nur kann ich nicht einräumen, daß Schäffer Ic. Inf. ratisb. tab. 6. fig. 6. 7. für Clythra Scopolina Fabric. gehalten wird. Man vergleiche meine *system. Nomenclat. der Schöff. Inf.* n. 6. 7. p. 9.

CLYTHRA AFFINIS. Fn. Inf. germ. XXV. 21.

Als eine eigene selbstständige Art von Herrn D. Illiger aufs neue erklärt.

CRYPTOCEPHALUS MORAEI. Fn. Inf. germ. LXVIII.

11.

Cryptocephalus Moraei. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 61. p. 52.

Schöff.

Schäff. Ic. Inf. ratisb. tab. 238. fig. 2. gehört nicht hieher: vergl. meine *system. Nomenclat. der Schäff. Inf.* n. 2. p. 196.

CRYPTOCEPHALVS VITIS. Fn. Inf. germ. LXVIII. 5.

Ist eine Abänderung von Cryptoceph. Coryli Fabr.

CRYPTOCEPHALVS OBSCURVS. Fn. Inf. germ. V. 12.

Eumolpus obscurus. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 19. p. 421.

CRYPTOCEPHALVS ARENARIVS. Faun. Inf. germ. XXXIX. 19.

Eumolpus arenarius. Fabric. Syft. Eleuth. I. n. 26. p. 423.

HISPA BIPUSTVLATA. Fn. Inf. germ. XLIII. 17 — nicht 34. 17.

Hispa bipustulata. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 6. p. 59.

Zwar allerdings die nehmliche *Fabriz* Art, die aber richtiger, nach Herrn D. *Illigers* Dafürhalten, unter *Dasytes* zu stehen kommt. Hieher gehört auch: *Melyris bipustulatus Rossi* Fn. Etr. I. 35. 86. tab. 7. fig. 14.

DRYOPS SVTVRALIS. Fn. Inf. germ. XLV. 12.

Ist wohl kein Dryops: mit mehr Recht kan diese Art den *Serropalpis* einverleibt werden. Ich finde keiner nirgends gedacht.

LAGRIA.

LACRIA FLAVIPES. Fn. Inf. germ. VI. 11.

Dasytes pallipes. Illig.

Melyris pallipes. Illig. Mag. I. p. 83.

LYTTA ERYTHROCEPHALA. Fn. Inf. germ. XLI. 6.

Ist nicht die wahre *L. erythrocephala Fabric.* und *Pallas*, die nicht in Deutschland zu Hause ist: die gegenwärtig hier abgebildete, muß in der Folge also bestimmt werden:

Lytta verticalis. Illiger.

Lytta erythrocephala Roffi Fn. Etruf. I. n. 593.
p. 291.

Cantharis dubia. Oliv. Inf. 46. tab. I. fig. 7.

Letzteres Synonym führt *Fabrizius* bey seiner *Lytta dubia*, wiewohl mit Unrecht an. Vergl. *Illig. Mag. III. p. 172.*

MYLABRIS FVESLYNI. Fn. Inf. germ. XXXI. 18.

Mylabris Cichorei. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 2. p. 81.

LYMEXYLON NAVALE. Fn. Inf. germ. XXII. 5.

Lymexylon navale. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 4. p. 88.

Schäffer Icon. Inf. ratisb. tab. 59. fig. 1. gehört nicht hieher: vergl. meine *System. Nomencl. der Schäff. Inf.* n. 1. p. 77.

LYMEXYLON BARBATVM. Fn. Inf. germ. XXII. 4.
ed. I.

Dir-

Dircaea barbata. Faun. Inf. germ. XXII. 4.
ed. II.

Lymexylon Morio. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 6. p. 88.

Der Grund, der in der zweiten Auflage meiner Faune von mir vorgenommenen Reformation der Nomenclatur dieses Käfers, lag in den eigenen Aeußerungen des Herrn D. *Illigers* — (Kug. Käf. Pr. I. n. 7.), welchen zu Folge ich glauben mußte, daß das damals mir vom Herrn Prof. *Hellwig* in Braunschweig zum Gebrauch für die Faune, gefälligst mitgetheilte Exemplar dieses Käfers, daselbe des *Lymexylon barbatum* Fabric. Ent. syft. II. n. 4. p. 92. und kein anderes seye. Zu meiner Verwunderung sehe ich nun (*Illig.* Mag. III. n. 6. p. 174.) daß dieses sich nicht also verhalte, und daß dieses vermeintliche *Lymexylon barbatum* Fn. I. c. nicht die *Dircaea barbata* Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 1. p. 88. seyn dürfe, sondern nur eine bloße Geschlechtsverschiedenheit von dem *Lymexyl. dermestoides* Fabric. und Faun. Ich weiche sehr gerne dieser neuern Bestimmung, um so mehr, da ich durch die Zurücksendung dieses *Lymexyl. barbatum* Fn. außer Stand gesetzt bin, hierüber etwas mehr, als den Grund meiner vorgenommenen Veränderung der ältern Nomenclatur vorzulegen und anzugeben.

Gleich-

Gleichwohl muß *Schäff.* Ic. Inf. Ratisb. tab. 66. fig. 1. bey allen Lymexyl. und Dircaeis wegfallen, weil daselbst nichts anders, als *Tenebrio Molitor Fabr.* vorstellig gemacht worden ist. Vergl. meine *Syst. Nomenclat. der Schäff. Inf.* n. 1. p. 83.

LYMEXYLON FLABELLICORNE. Fn. Inf. germ. XIII.
10.

Eine eigene Art, die im Preussischen vorkommt.

LYMEXYLON LAEVIGATVM. Fn. Inf. germ. XXIV.
16. ed. I.

Dircaea discolor. Faun. Inf. germ. XXIV. 16.
ed. II.

Dircaea discolor. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2.
p. 89.

Der hier abgebildete Käfer ist gewis nichts anders, als der hier genannte. Die Beschreibung des Herrn D. *Illigers* seines *Serropalpus laevigatus* Kug. Käf. Pr. I. n. 8. p. 131. trifft vollkommen zu. Jedoch muß ich bemerken, daß diese Figur, wohl größtentheils, und zumal durch Zuthat der Illuministen, mißrathen ist. Die vor mir liegende Mahlerey des Herrn *Sturms* ist der Natur viel getreuer, in welcher wenigstens gar keine *Streifen* auf der Flügeldecke zu sehen sind. Ausserdem ist das Bruststück falsch illuminirt, es soll keineswegs metallgrün seyn, auch die Farbe der

der Flügeldecken ist verfehlt, sie ist viel zu hell. Die Fußblätter sind auch verfehlt, so wohl der Zahl ihrer Glieder, als ihrer verhältnismässigen Proportion nach. In dem 97 Hefte habe ich eine richtigere Abbildung veranstaltet.

HALLOMINVS VNDATVS. Fn. Inf. germ. LXVIII. 23.

Da ich diesen Käfer nicht mehr besitze, so bin ich außer Stand, über dessen specifische Identität so wenig, als über dessen generische Dignität etwas zu äussern. Nur mit grosser Wahrscheinlichkeit kan er unter den Dircaeis eingereiht werden: ob unter den saltatoriis,? kan ich gar nicht entscheiden.

HALLOMINVS PURPUREVS. Fn. Inf. germ. LVII. 22:
und

HALLOMINVS TESTACEVS. Fn. Inf. germ. LVII. 23.

Herr D. Illiger hält sie für Arten unter Catops gehörig: das wohl möglich seyn kan. Ich besitze beide nicht mehr.

CUCUVS BIPYSTVLATVS. Fn. Inf. germ. IV. 13.

Nur eine Abänderung von *Cucuius monilis Fabric.*

RIPIPHORVS CARINTHIACVS. Faun. Inf. germ. XXII. 7.

Ripiphorus lituratus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 14. p. 120.

Vergl. *Illig. Mag.* III. n. 14. p. 177. Dieser *Fabriz. R. lituratus* sey eine Abänderung von *R. bimaculatus* F.

RIPIPHORVS ANGVLATVS. Fn. Inf. germ. XC. 3.

Ist das *Weibchen* vom *Rip. paradoxus Fabr.* Kommt nach Herrn D. *Illigers* Versicherung auch auf dem Harze vor.

MORDELLA DORSALIS. Fn. Inf. germ. XIII. 15.

Mordella variegata. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 122.

MORDELLA NEUWALDEGGIANA. Faun. Inf. germ. XXXVI. 8.

Mordella brunnea. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 18. p. 123.

Ohngeachtet die nun folgenden *Donaciae*, bereits in der *zweiten Auflage* des neun und zwanzigsten Heftes der Faun. Inf. rucksichtlich, auf die, so wohl in der *A. L. Z.* Nr. 143. p. 323. als in dem *Illigerschen* Mag. III. p. 178. mitgetheilten Bemerkungen, berichtigt worden sind, so will ich jedoch solche auch hier anschließen, um theils keine Lücke zu lassen, theils solche denjenigen Besitzern der Faun. Inf. mitzutheilen, welche diese zweite Auflage noch nicht in Händen haben.

DONAC.

DONACIA STRIATA. Fn. Inf. germ. XXIX. 1.

Donacia crassipes. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 1.
p. 126.

DONACIA DISCOLOR Mas. Fn. Inf. germ. XXIX. 3.

Donacia discolor Fem. Fn. Inf. germ. XXIX. 4.

Donacia sericea. Illiger.

Leptura sericea. Linn. Syst. Nat. n. 8. p. 638.

Leptura sericea. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 64.
p. 365.

Vergl. Illig. Mag. III. n. 4. p. 179.

DONACIA PALVSTRIS. Fn. Inf. germ. XXIX. 10.

Donacia nigra. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 9.
p. 128.

DONACIA CLAVIPES. Fn. Inf. germ. XXIX. 13.

Donacia Menyanthidis. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 14. p. 129.

DONACIA SEMICYPREA. Faun. Inf. germ. XXIX.
14.

Donacia simplex. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 13.
p. 129.

DONACIA SIMPLEX. Fn. Inf. germ. XXIX. 15.

Donacia linearis. Hoppe Elytr. erl. p. 46. tab. 1.
fig. 10.

MELOLONTHA FLORICOLA. Fn. Inf. XLVII. 17.
exclus. Syn. Fabric.

Melolontha austriaca. Herbst Archiv. IV.
n. 22. p. 16. tab. 19. fig. 26.

Die *Melolon. floricol.* Fabric. stellt diese Abbildung nicht vor, sondern nur die *Mel. austriaca Herbst.*, die von der *floricola* ganz verschieden ist, weswegen auch das *Herbst'sche* Citat, bey *Fabric.* wegfallen muß.

MELOLONTHA FRUTICOLA. Fn. Inf. XLVII. 16.

Melolontha fruticola. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 94. p. 176.

Ist nur das *Weibchen* der *frutic.* wiewol nicht zum besten gerathen, weswegen man solches leicht, für eine Abänderung der *Mel. agricola*, die es nicht ist, ansehen konnte.

MELOLONTHA FARINOSA. Fn. Inf. germ. XXVIII.
16.

Melolontha farinosa. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 99. p. 177.

Hoplia caerulea. Illig.

Hierher gehört auch *Melol. caerulea Herbst.* Nat. d. K. etc. und *Mel. squamosa Oliv.* aber keineswegs *Scarab. farinosus Lin.* welches Citat bey dieser *Mel. farinosa* auszustreichen ist.

MELOLONTHA SQVAMOSA. Fn. Inf. germ. XXVIII.
17.

Melolontha squamosa. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 100. p. 177.

Hoplia

Hoplia squamosa. Illig.

Nach Herrn D. Illigers Meinung scheint der Scarab. farinosus Linn. nur eine Abänderung dieser Mel. squam. zu seyn.

MELOLONTHA ARGENTEA. Fn. Inf. germ. XXVIII.
18.

Melol. pulverulenta, Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 105. p. 178.

Hoplia pulverulenta. Illig. Mag. II. p. 229.

Diese ist nicht die Melol. argentea Fabric. welche nun für eine Abänderung der Hoplia squamosa Illig. vom Herrn D. Illiger gehalten wird, sondern dessen *Hoplia pulverulenta*. Zu ihren Abänderungen gehört *Mel. pulverulenta Fabric.* jedoch mit Ausschließung aller von ihm angeführten Citaten.

MELOLONTHA GRAMINICOLA. Faun. Inf. germ.
XXVIII. 19.

Melolontha graminicola. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 106. p. 179.

Hoplia graminicola. Illig.

Ist eine eigene sonst mit keiner bekannten ähnlichen zu verwechselnde Art. Das irrige Citat bey Fabricius *Herbst. Archiv. tab. 25. fig. 3.* ist in *Herbst. Nat. d. Käf. III. n. 71. tab. 25. fig. 3.* zu verbessern.

MELO-

MELOLONTHA PULVERULENTA. Faun. Inf. germ.
XXVIII. 20.

Hoplia minuta. Illig.

Diese ist nicht *Melol. pulverulenta* Fabric. eher
vielleicht *Mel. pulverul.* Herbst. Man trifft sie,
nach Herrn D. Illigers Versicherung auch im
Preussischen an.

MELOLONTHA CHRYSOMELOIDES. Fn. Inf. germ.
XXXIV. 11.

Melolontha chrysomelina. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 108. p. 179.

Scarabaeus chrysomeloides. Sturm ent. Handb. I.
n. 56. p. 62.

Ogleich die wahre *Mel. chrysomel.* Fabr. —
wenn schon nicht unter *Melolontha* gehörig, hier
vorgestellt worden ist, so denn noch nicht, *Scarab.*
chrysomeloides Schrank, der unstreitig einerley mit
Melolontha variabilis Fabric. ist. Vergl. Schrank's
Fn. boic. I. 2. p. 412.

BUPRESTIS PRUNI. Fn. Inf. germ. XXIX. 21.
ed. I.

Buprestis undata. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 109. p. 206.

BUPRESTIS APPENDICULATA. Faun. Inf. germ.
LXVIII. 22.

Buprestis appendiculata. Fabric. Ent. Syst. II.
n. 102. p. 210.

Bupre-

Buprestis Morio. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 133. p. 210.

Demohngeachtet, wenn gleich diese Abbildung, *Elytra apice ferrulata* anzeigt, und *Fabrizius* solche unter die Arten mit *elytris integris* stellt, ist diese genannte Art hier vorgestellt, die, wie mich ein wiederholter Vergleich, mit meinen *Exemplaren* und dieser Abbildung belehrte, allerdings, jedoch nur sub oculo bene armato, an der Spitze, wiewohl noch höher am äussern Rande der Flügeldecken hinauf, solche ungemein zarte Einzählungen hat.

Paykull. Fn. Suec. II. n. 17. p. 230. gehört hier, dessen Beschreibung vollkommen zutrifft.

BUPRESTIS HYPERICI. Fn. Inf. germ. LXVII. 18.

Ist eine eigene Art, aber nicht *B. elata Fabric.*
Diese ist folgende:

BUPRESTIS SINUATA. Fn. Inf. germ. XXXV. 13.

Buprestis elata. Fabric, Syst. Eleuth. II. n. 149.
p. 213.

BUPRESTIS TARDA. Fn. Inf. germ. LXVIII. 21.

Buprestis cyanea. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 168. p. 216.

BUPRESTIS GRAMINIS. Fn. Inf. germ. LXVI. 8.

Buprestis Graminis. Herbst. Nat. d. Käf. IX.
n. 180. p. 262, tab. 155. fig. 5. a. b.

Herr

Herr Creützer sagt in seinen Versuchen p. 137. *Buprestem graminis* n. 8. (nehmlich Fn. Inf. germ. LXVI.) non Viennae, sed in vicinia maris Adriatici lect. esse, ex ore ipsius accepi collectoris — Megerlaei &c.

Man erlaube mir nun doch auch, als Gegenstück des voranstehenden anzuführen, was ich zwar nicht *ex ore*, des Herrn von Megerle in Wien, sondern aus dessen Schreiben an mich, vom 5ten Oktob. 1798, hierüber erhalten habe: n. 16, *Buprestis* — (und diese war *Bupr. graminis* Fn.) neu — auch hier um Wien auf hohem Grafs; ich bitte sie zu benennen.

BUPRESTIS CANDENS. Fn. Inf. germ. I. 9.

Buprestis candens. Fabric. Syst. Eleuth. II, n. 171. p. 217.

Hierher gehört auch:

Buprestis fulminans. Schrank im Naturf. XXIV. n. 52. p. 84.

Buprestis fulminans. Hoppe elytr. erlang. p. 51.

Buprestis fulminans. Schrank Fn. boic. I. 2, n. 796. p. 604.

Um einigermaßen, auf die Hauptfarbe dieses Käfers hindeuten zu können, zumal andere sogenannte Trivialnamen, womit sich derselbe etwa eben so benennen liesse, *rutilans*, *ignita*, *fulminans*, *fulgida*, &c. schon ehebevor, vom Herrn Prof.

Prof. *Fabrizius*, andern Bupresten zugetheilt worden, wählte ich das Wort *candens*, keineswegs aber, um den Begriff, den Herr *Schrank* damit verbindet, ganz damit *erschöpfen* zu wollen; nach welchem *nur dann* ein schwarzer Körper glüht, wenn er *weiß* ist, weil *candere*, nichts *als weiß* bedeuten soll. Darum wäre *Buprestis fulminans* wohl ein weit *schicklicher Name*, wenn man sich nur darüber vereinigen könne, daß dasienige, was man insgemein unter *blitzen* versteht, auch die *Farbe* dieses Käfers seye. Ueberhaupt glaube ich, daß die Kritik nirgends unbequemer angebracht seyn würde, als wenn man sie um dergleichen Beynamen, oder Trivialnamen abzuwägen usurpirt. Wie würde *Linné*, *Fabrizius* und andere dagegen bestehen können? Wie *Fabrizius* mit seiner *Melolontha ridens* Ent. Syst. II. n. 104. p. 178?

ELATER RUFVS. Fn. Inf. germ. X. 11.

Elater rufus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 24. p. 225.

Bey *Fabrizius* sind die Citate meiner Faune irrig; man lese: *Elater rufus* X. 11. und *Elater ferrugineus* X. 10.

ELATER ATOMARIUS. Fn. Inf. germ. LXXVI. 1.

Elater atomarius. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 42. p. 229.

Ich

Ich habe nirgends einen *Elater pulverulentus* bekannt gemacht: man streiche daher dieses Synonym in dem Syst. Eleuth. l. c. aus, und verwechsle es mit diesem.

ELATER CUPREUS. Fn. Inf. germ. LXVII. 2. 3.

Elater cupreus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 54.
p. 231.

Schäff. Ic. Inf. ratisb. tab. 38, fig. 2. gehört nicht hieher, und bezeichnet meinen *Elater signatus*. Vergl. meine *Nomenclat. der Schäff. Inf.* n. 2. p. 54.

ELATER MELANCHOLICUS. Fn. Inf. germ. XCIII.
11.

Elater melancholicus. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 100. p. 241.

Durch einen seltsamen Mißgrif, kam dieser, bis izt noch undeutsche Käfer, in die Faun. Inf. Einen diesem sehr ähnlichen fieng ich zugleich, mit dem *Elat. aeneus* F. an einer meinem Wohnorte nahe gelegenen Hecke, und nur diesen wollte ich hier zeichnen lassen. Doch nachher, da es nicht mehr zu ändern war, entdeckte ich diesen Irrthum, den ich hier zur Steuer der Wahrheit anzeige.

ELATER CINCTUS. Fn. Inf. germ. XXXI. 21.

Elater equestris. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 119.
p. 244.

ELA-

ELATER SIGNATUS. Fn. Inf. germ. LXXVII. 5.

Schäffer Ic. Inf. ratisb. tab. 38. fig. 2.

Eine eigene sich sehr charakterisirende selbstständige Art. Sie varirt iedoch sehr.

α *Mas*: antennis pectinatis, cum maculis in apice elytrorum: *Elater signatus* Fn.

β *Mas*: antennis pectinatis, absque maculis in apice elytrorum: *Elater aulicus* Fn.

γ *Femina*: antennis simplicibus, cum maculis in apice elytrorum.

δ *Femina*: antennis simplicibus, absque maculis in apice elytrorum.

ELATER AULICUS. Fn. Inf. germ. LXXVII. 6.

Ist daher nur die obige var. β . Mit dem *Elater inaequalis* Fabric. glaube ich diesen Springkäfer nicht wohl vereinigen zu können: es müßte denn seyn, daß *Fabrizius* ein Exemplar mit röthlichen Flügeldecken, und zwar obige var. δ vor sich gehabt hätte, da er der *antennar. pectinatar.* nicht gedenkt.

Beide Abbildungen in der Faun. Inf. a. a. O. sind in Hinsicht der proportionirlichen Gröfse verfehlt: *Elater signatus* ist zu klein gerathen, und *Elat. aulicus* allzugrofs: denn beide sollen die natürliche Gröfse vorstellen.

ELA-

ELATER STICTICVS. Fn. Inf. germ. LXXVII. 9.

Gewiss dem *Elat. marginat. Fabric.* zumal nach der Abbildung zu schliessen, sehr ähnlich, doch um vieles kleiner, auch sonst, durch die angegebenen Merkmale, und den übrigen Habitus verschieden, weswegen ich solchen gegenwärtig noch, von demselben entfernt zu halten, anrathen möchte.

ELATER LEPIDOPTERVVS. Faun. Inf. germ. LXXVIII. 4.

Sonst auch unter *Elater chrysopastus*, wie mich Herr D. Illiger versicherte, bekannt, ausserdem eine distinct verschiedene Art.

ELATER TAENIATVS. Fn. Inf. germ. LXXVI. 5.

Elater fasciatus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 43. p. 129.

Herr D. Illiger hält dieses *taeniatus* nur für eine Abänderung des *E. fasciatus Fabr.* wiewohl nicht nur die Grösse, sondern auch dessen übrige Eigenheiten, hiemit in Widerspruch zu stehen scheinen.

ELATER CRUCIFER. Fn. Inf. germ. LXXVI. 7.

Eine eigene Art: Hicher gehört: *Elater Rossi. Oliv. Inf. 31. 52. 74. tab. 5. fig. 44. a. b.*

ELATER TRIFASCIATVS. Fn. Inf. germ. III. 14.

Elater undulatus, Payk. Fn. Suec. II. n. 10. p. 8.

Degeer Inf. IV. n. 18. p. 155. tab. 5. fig. 23.
bis 26.

Fabrizius hat jedoch schon einen *Elat. undulatus*, weshalb, wie Herr D. *Illiger*, mit Recht erinnert, dieser ältere, vom Herrn Prof. *Hellwig* angegebene, den Vorzug verdient.

ELATER RUBENS. Fn. Inf. germ. VIII. 10.

Elat. denticollis. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 61. p. 233.

Hierher gehört auch: *Elat. pyrrhopterus* Fab.
Syst. Eleuth. II. n. 82. p. 237.

ELATER BICOLOR. Fn. Inf. germ. VIII. 11.

Elat. linearis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 62.
p. 233.

Ist das *Männchen*, wozu *Elat. mesomel*. Fabr.
als das *Weibchen* gehört.

ELATER NIGRICORNIS. Fn. Inf. germ. LXI. 5.

Elat. metallicus. Payk. Fn. Saec. III. n. 22.
p. 19.

ELATER FLAVICORNIS. Fn. Inf. germ. LXI. 6.

Befize ich nicht mehr, um über dessen Identität zu entscheiden.

ELATER PARVVLVS. Fn. Inf. germ. LXI. 7.

In der differentia specifica, muß statt *elytris nigris* &c. antennis nigris gelesen werden. Auch diesen besize ich nicht mehr.

LYCA-

LVCANVS DORCAS. Fn. Inf. germ. LVIII. 11.

Doch alle diese mir charakteristisch gedünkten Auszeichnungen, scheinen nicht zu genügen. Er soll demohngachtet nur *Spielart* des *männlichen Luc. Cervus F.* seyn.

LVCANVS CAPRA. Fn. Inf. germ. LVIII. 13.

Sey nur *Weibchen* des *Lucan. parallelipipedus F.* Aber auch Herr *Schrank* in seiner Fn. boic. I. 2. p. 376. bestimmt diesen Käfer, unter:

Lucanus bipunctatus nr. 323. als eigene Art, und scheint fast hievon überzeugt zu seyn: ich glaube, dafs es sehr gut wäre, wenn sich alle *Weibchen* so kenntlich auszeichneten.

LVCANVS RVFIPES. Fn. Inf. germ. LVIII. 14.

Lucanus rufipes. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 14. p. 253.

Auch dieser sey nur *Spielart* des *weiblichen Luc. caraboides F.*, und dieß ist, nach den, von Herrn D. *Illiger*, in der Uebersetz. von *Olivier*, beygebrachten Gründen, sehr annehmbar.

LVCANVS SCARABAEOIDES. Fn. Inf. germ. XXVI. 15. 16.

Aesalus scarabaeoides. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 254.

PRIONVS SERRARIVS. Fn. Inf. germ. IX. 6.

Es wird zwar sehr oft behauptet, daß dieser *Serrarius* nur Geschlechtsunterschied des *Prion. Faber Fabr.* seye. Ich kan jedoch diese Behauptung nicht durch eigene Erfahrung widerlegen, da dieser Käfer in meinen Gegenden, gar nicht, oder nur höchst selten vorkommen soll. Mich konnten nur, die von dem *Faber* sehr abweichenden Eigenheiten bestimmen, diesen *Serrarius* von demselben für verschieden zu glauben. Indessen halte ich solchen dennoch so lange für eine eigene Art, bis mehrere und bekanntere Erfahrungen, solchen zu seiner Stammart, wieder zurück weisen.

CERAMBYX CRINITVS. Fn. Inf. germ. XLVIII. 17.

Cerambyx Quercus, Roffi Fn. Etrusc. I. n. 362.
p. 143.

LAMIA VITTIGERA. Fn. Inf. germ. XVIII. 24. ;

Lamia vittigera, Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 119.
p. 303.

Hier ist das *Weibchen* abgebildet. Das *Männchen* ist beträchtlich kleiner, die Grundfarbe tief schwarz, und die weißen Streifen nehmen sich daher lebhafter aus.

STENOCORVS DISPAR. Fn. Inf. germ. XVII. 1. 2. ed. I.

Rhagium dispar, Fn. Inf. germ. XVII. 1. 2. ed. II.

Bestätigt sich jedoch als eigene Art.

RHAG-

RHAGIVM MINVTVM. Faun. Inf. germ. VIII. 13.
ed. I.

Rhagium clathratum. Fn. Inf. germ. VIII. 13.
ed. II.

Rhagium clathratum. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 9. p. 315.

SAPERDA ARGVS. Fn. Inf. germ. LXIX. 2.

Saperda Argus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 61.
p. 329.

SAPERDA MICANS. Fn. Inf. germ. XXXV. 14.

Saperda violacea. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 75.
p. 331.

SAPERDA FLAVIMANA. Fn. Inf. germ. XXXV. 15.

Saperda rufimana. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 85. p. 332.

SAPERDA BIPVNCTATA. Fn. Inf. germ. XXXV. 16.

Ich besitze diese – wahrscheinlich eigene Art
nicht mehr, um hierüber zu bestimmen.

CALLIDIUM PVSILLVM. Fn. Inf. germ. LXXX. 6.

Callidium pusillum. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 63. p. 344.

Bestätigt sich aufs neue, daß diese meine Be-
stimmung die richtigere seye. Vergl. *Creuzer*
Vers. nr. II. p. 136. Hieher gehört auch, *Rossi*
Fn. Etrusc. Mant. n. 132. p. 53.

CALLIDIUM VINI. Fn. Inf. germ. LXVI. 10.

Callidium pygmaeum. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 30. p. 339.

Herr von Megerle, dem ich diese Art verdanke, bemerkte bey der Einsendung derselben unterm 5ten Oktober 1793 aus Wien, folgendes an mich:

„8. *Callidium pusillum*. Halten Sie es auch dafür? Bilden Sie es auf alle Fälle ab: denn „alle Jahre finden wir selbiges hier, und was „das spassigste ist, in alten Fässern, die mit „Birkenreifen beschlagen sind.“

Wohl verzeihlich wirds, wenn ich dann voranstehendes, in *habitat quotannis in doliis vetustis Viennae*, übersezte.

CALLIDIUM FLORALE. Fn. Inf. germ. LXX. 16.

Clytus floralis. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 3. p. 346.

CALLIDIUM ARIETIS. Fn. Inf. germ. IV. 15.

Clytus Gazella. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 10. p. 348.

Leptura arietis. Linn. Syft. Nat. n. 23. p. 640.

LEPTURA SANGVINOLENTA. Mas. Fn. Inf. germ. LXIX. 9.

Leptura cincta. Mas. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 12. p. 356.

H

Leptura

Leptura limbata. Laichard. tyr. Inf. II. n. 16.
p. 166. *exclus.* *Synonym.* Schöff.

Ist nach wiederholten Erfahrungen, *nicht*,
was man anfangs, fast allgemein geglaubt hatte,
das *Männchen* der *Lept. sanguinol. Fabr.* sondern
dieses, der *L. cinctae Fabr.*

LEPTURA SANGVINOLENTA. *Maris Var.* Fn. Inf.
germ. LXIX. 10.

Eben so nur eine Abänderung der *männlichen*
L. cinctae Fabr.

LEPTURA VILLICA. Fn. Inf. germ. XXII. 13.

Leptura villica. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 16.
p. 357.

Das *Schäffer'sche Synonym*, inf. ratisb. tab. 69.
fig. 1. gehört durchaus nicht hieher. Vergl. meine
System. Nomenclat. der Schöff. Inf. n. 1. p. 86.

LEPTURA OBSCURA. Fn. Inf. germ. LXIX. 20.

Leptura Chamomillae. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 30. p. 339.

Ich kenne die *Lept. pubescens Fabr.* nicht hin-
länglich genug, um zu entscheiden, ob solche
dieser Käfer ist, mit welchem die hier vorgestell-
te, von mehreren vereinigt wird: aber die bey
uns häufige *Leptura holosericea F.* kenne ich zu
gut, um gewis zu seyn, dafs gegenwärtige Figur,
nach keinem Exemplar derselben verfertigt wor-
den.

den. Hingegen ist meine ehemalige *L. obscura* genau diese *L. chamomillae*: denn nur auf diese trifft das *elytra apice in angulum excurrunt* genau zu, die übrigens sich von *L. holosericea*, so wohl durch ihre verschiedene Gröfse, als Umrifs des Körpers gut unterscheidet.

LEPTVRA SEXMACULATA. Fn. Inf. germ. LXIX. 21.

Leptura octomaculata. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 44. p. 361.

Schäffer. Ic. Inf. ratish. tab. 6. fig. 9.

Demnach fällt die ganze Synonymie in der Fn. Inf. bey diesem Käfer hinweg: ingleichen ist in meiner *system. Nomenclat. der Schäff. Inf.* n. 9. p. 9. die daselbst befindliche Bestimmung, als irrig, nach dieser zu emendiren.

LEPTVRA ARCVATA. Fn. Inf. germ. VIII. 12.

Ich besitze diesen Käfer nicht mehr. Mit *Leptura annularis* Fabric., die ich jedoch nicht genau genug kenne, um mit Gewifsheit hierüber zu entscheiden, hat, der Beschreibung nach, diese *Lept. arcuata*, sehr viel übereinstimmendes.

NECYDALIS MELANOCEPHALA. Faun. Inf. germ.

XXXVI. 9.

Man behauptet, *Necydal. melanocephala* Fabric. sey nichts anders, als nur Abart seiner *ustulata*, oder — welches jedoch Unterschiedes genug ist —

ihr nahe verwandt. Hierüber, da ich den Fabrizioſchen Käfer nur aus ſeiner Beſchreibung kenne — kan wenigſtens ich, nichts erhebliches aufbringen. Es ſey nur von meiner *N. melanocephala* die Rede, die, wenn ſie gleich doch *Fabrizius*, nun auch mit ſeiner *melanocephala* verbunden, dennoch den Beweis für mich nicht verſtärken ſoll. Nur mein Käfer ſey *Necydalis flavescens Roſſi* Mant. Inf. n. 139. p. 56. oder vielmehr nur Abänderung derſelben, wohin auch *Geoffr. I.* n. 5. var. p. 343. gehöre: das glaube ich auch, nur daſs ſolche das *andere Geſchlecht* von *Necyd. Podagrariae F.* zugleich auch ſeyn könne, das muſs ich mit *Villers Ent. I.* p. 281. verneinen.

NECYDALIS FEMORATA. Fn. Inf. germ. XXXVI.

12.

Fabrizius führt in dem Syſt. Eleuth. II. n. 30. p. 373. dieſe meine femorata nur zweifelhaft bey ſeiner *Necydal. marginata* an, und fragt ob ſolche etwa, wegen der femor. clav. nur das andere Geſchlecht von der ſeinigen ſeye? Ich glaube, die *Cantharis phthiſca Scop. carn. n. 144. ic. 144.* gehöre, nach der Abbildung zu ſchließen, welche femora ſimplicia anzeigt, gleichwohl auch hieher, und dieſe *femorata*, könne füglich als das *andere Geſchlecht*, analogice hiezu genommen werden.

NECY-

NECYDALIS COLLARIS. Fn. Inf. germ. XXXVI.

10.

Necydalis melanura. Fabric. Syst. Eleuth. II:

n. 17. p. 371.

Nur als Abänderung gehört *collaris* unter *melanura*, denn diese *melanura* sey selbst nur Spielart der *Necyd. ustulata*. Fabr.

NECYDALIS ADVSTA. Fn. Inf. germ. [XXXVI. 11:

Diese *adusta* hält man für das Weibchen von *simplex*. Fabr. Diefs widerspricht aber schon der um vieles und ganz anders ausgezeichnete Körper. Meine *Necyd. adusta* ist so groß wie *Necyd. melanura* Fabr.; aber nie sahe ich die bey uns häufige *N. simplex* F. von dieser Gröfse.

NECYDALIS FLAVICOLLIS. Fn. Inf. germ. XXIV.

18.

Necydalis sanguinicollis. Fabric. Syst. Eleuth. II:

n. 7. p. 370.

Ueber diese richtige Bestimmung, leistet dasselbe Exemplar Gewähre, welches Herr *Hübner* in Halle, Herrn D. *Illiger* mitgetheilt hat, dem ich solche verdanke.

SINODENDRON MURICATVM. Fn. Inf. germ. XXXV.

15.

Sinodendron muricatum. Fabric. Syst. Eleuth.

II. n. 6. p. 377.

Man

Man glaubt, dieses Sinodendron stünde besser unter *Apate*.

BOSTRICHVS CHALCOGRAPHVS, Faun. Inf. germ.
XV. 4.

Bostrichus sexdentatus. Oliv. V. 111. 13. ic. 77.
tab. I. fig. 3. a. b.

Apate sexdentata. Illiger.

Der wahre *Bostrich. chalcographus* Fab. ist Fn.
XXXIX. 20. abgebildet worden; dieser gehört
unter *Apate*.

BOSTRICHVS THORACICVS, Fn. Inf. germ. XXXIV.
18. *Femina*.

Apate dispar. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 21.
p. 382.

Bostrichus dispar. Herbst, Nat. d. Käf.

Nach Herrn D. *Illigers* eigener Bestimmung,
und angefügter Bemerkung, gehört dieser kleine
Borkenkäfer vielmehr unter *Bostrichus* als unter
Apate. Mir wurde ehehin dieses Exemplar, nach
welchem diese Zeichnung verfertigt worden,
vom Herrn Prof. *Hellwig* in Braunschweig, un-
ter obigen Namen gefälligst mitgetheilt.

BOSTRICHVS BREVIS, Fn. Inf. germ. XXXIV. 20.

Hyletinus abietinus. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 6. p. 391.

Nach

Nach Herrn D. Illigers *Bestimmung*, sey dieser *Bostr. brevis* Fn. nur das *Männchen* des obigen *Bostrich. thoracicus* Fn., mit dem es nicht selten in Braunschweig in der Begattung gefangen worden. Das ist wohl glaublich, und die Sexualaffinität beyder läßt schwerlich Zweifel übrig, nur gehört auch der *Hylesinus abietinus* Fabric. l. c. hieher.

BOSTRICHVS SERRATVS. Fn. Inf. germ, XXXIV.
19.

Ein kleines eben der Puppenhülse entschlüpftes Stück von Bostr. dispar Herbst. Wir besitzen ein solches von diesem. Illiger.

Dies ist nicht wohl anzunehmen. Mag es seyn, daß der bleichen Farbe nach zu urtheilen, dieser *B. ferratus*, ein eben der Puppenhülse entschlüpftes Stück sey, so kan er doch durchaus nicht mit *Apate dispar* vereinigt werden. Diesem widerspricht nicht nur die *allzusehr abweichende Größe*, die Villofität der Flügeldecken, sondern auch die bey weitem zärteren, und kaum unter einem sehr guten Suchglase bemerkbaren Punktfstreifen der Flügeldecken, der ganz gelbe Unterleib, und der völlig unter das Bruststück zurückgezogene kleine Kopf. Die Abbildung stellt dies alles nicht deutlich genug vor: die Punktfstreifen sind viel zu stark angegeben.

Bo-

BOSTRICHVS FLAVIPES. Fn. Inf. germ. LXI. 9.

Ich besitze diesen Käfer nicht mehr, um über solchen mit Gewisheit zu sprechen. Vielleicht ein *Hylefinus*?

BOSTRICHVS DACTYLIPERDA. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 14. p. 387.

Diese genannte Art, bey welcher Herr *Fabrizius* meine Fn. Inf. citirt hat, kommt gar nicht hier vor; ein sehr wahrscheinliches Mißverständniß hat dieses Citat veranlaßt.

BOSTRICHVS FRAXINI. Fn. Inf. germ. LXVI. 15.

Hylefinus Fraxini. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 3. p. 390.

Vergl. *Creutzer* Versuche p. 136. woselbst dieser *Bostriehus Fraxini* Fn. l. c. für eine Spielart des *Bostrieh. varius Fabr.* ausgegeben wird. Herr *Creutzer* irrt sich aber sehr, wenn er dies noch glauben dürfte. Ich kan nicht wissen, was für einen *Hylefinus* Herr Prof. *Fabrizius* vom Herrn Apotheker *Scheidler* erhalten hat, nur das weiß ich, daß ich mehrere Exemplare meines *Bostrieh. Fraxini* Fn. an Herrn Prof. *Fabrizius* geschickt habe, der auch damals schon eben diesen *Bostr. Fraxini* Fn. für eine neue, und von dem *B. varius* ganz verschiedene Art, erkannt hat. Es wäre auch gut gewesen, wenn Herr Prof. *Fabrizius* angezeigt hätte, wenn man die Beobachtung verdankt,

dankt, dafs dieser *Bostrichus Fraxini* Fn. an der Rinde der Esche folche tophusartige Auswüchse bearbeitet, denn ich habe doch zuerst folche bekannt gemacht. An den, in der Hopfau bey Herspruck stehenden Eschen kan man iährlich im August und September folche in grosfer Menge antreffen, und aus solchen von der Rinde glatt hinweg geschnittenen Tophis, habe ich mehrere hunderte Exemplare vor mir gehabt, die sich sämtlich, etwa mehrere oder mindere Gröfse abgerechnet, ganz gleich waren.

BOSTRICHVS TESTACEVS. Fn. Inf. germ. LXVI. 14.

Vergl. *Creutz*. Verf. p. 136. wofelbst dieser *B. testac.* Fn. nur für eine Spielart des *Bostrich.* nun *Hylesin.* piniperd. Fab. — und wie auch ich glaube, mit Recht anerkannt wird. Es ist hier nur ein noch frisches ohnlängst der Puppenhülle ent schlüpftes Exempl. dieses *Hylesin.* piniperd. F., vorstellig gemacht worden. Folglich fällt das Citat der Fn. in der Syst. Eleuth. II. n. 14. p. 393. bey *Hylesin. testaceus* von selbst hinweg.

BOSTRICHVS POLIGRAPHVS. Fn. Inf. germ. XV. 5.

Bostrichus polygraphus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 12. p. 387.

Linné schrieb stets *polygraphus*, nicht *polygraphus*, so wie *Polianthes* nicht *Polyanthes*, darum schrieb auch ich so, weil ich glaubte, es ziemte
iedem

iedem, der *Linnées* Nomenclatur, oder auch die — irgend eines andern Naturforschers wiederholen muß, solche, wenn sie nicht offenbar irrig ist, auch *correct* wieder zu geben, wäre es auch nur aus Achtung, für den, der solche zum erstenmal gebraucht hat. Auch lasse es sich, meiner Meinung nach, gar wohl denken, daß ein so correcter Mann, wie *Linné* war, wohl *polygraphus* und *Polyanthes* geschrieben haben würde, wenn er hiebey die Begriffe hätte verbinden wollen, die man gewöhnlich mit *πολυγραφος* und *πολυανthes* zu verbinden pflegt: um so mehr wollte wenigstens ich nicht, *Linné* einen Begriff zuschieben, den er im Leben wahrscheinlich als nicht *sein eigen* anerkannt haben würde.

BRUCHVS LYTEICORNIS. Fn. Inf. germ. XXV. 23.

Ist eine eigene Art.

BRUCHVS IMERICORNIS. Fn. Inf. germ. XXV. 24.

Bruchus Galegae. Roffi Fn. Etrusc. Append.

82. 10.

Diese Bestimmung wurde mir vom Herrn D. Illiger gefälligst mitgetheilt. Ich besitze den Append. Fn. etrusc. nicht.

ANTHRIBVS BREVIROSTRIS. Fn. Inf. germ. LVII. 9.

Anthribus niveirostris. Fabric. Syst. Eleuth. II.

n. 18. p. 409.

AN-

ANTHRIBVS RUFICOLLIS. Fn. Inf. germ. XXIV. 19.

Salpingus ruficollis. Illig.

Kein *Anthribus*! Vom *Anthribus Roboris* Fab. ist dieser Käfer standhaft verschieden.

ATTELABVS BACCHVS. Fn. Inf. germ. XX. 5.

Attelabus Bacchus. Fabric. Syft. Eleuth. II.

n. 27. p. 421.

In dem Syft. Eleuth. a. a. O. kommt nun zum *erstenmal* die richtige Bemerkung vor: *Variat sexu; thorace antrorsum spinoso*. Diese Abbildung, so wie *Voet*. II. tab. 34. fig. 6. haben schon lange zuvor diese Bemerkung erwiesen. Doch hat man in der A. L. Z. 1797. Nr. 39. p. 306, das Gegentheil behauptet: *Das mit zwey Dornen bewaffnete Brustschild* (nehmlich an dieser meiner Figur in der Fn. Inf. a. a. O.) *ist eine auffallende Erscheinung. Wir finden dazu weder unter unserm Vorrathe, noch bey andern Schriftstellern das Beyspiel. Die Vermuthung, daß daher dieser Käfer nicht der Bacchus sey, gewinnt durch &c.* (nun folgen die unnöthig hieher zusezenden Gründe) *den größten Schein der Gewissheit.* —

Ich hätte demnach, nach *Voet* a. a. O. das größte Recht an der Entdeckung, *daß es einen Attelab. Bacchus Fabr. et Linn. mit einem stachlichten Bruststück gebe.* Vergleiche meinen Commentar zur angeführten *Voetschen* Figur, IV. Th. meiner Ausgabe p. 47.

ATTE-

ATTELABVS CRACCAE. Fn. Inf. germ. XX. 10.

Attelabus aeneus. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 37. p. 423.

ATTELABVS FRUMENTARIIVS. Fn. Inf. germ. XX.
14.

Attelabus frumentarius. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 59. p. 427.

Attelabus purpureus. Fabric. Ent. Syst. II.
n. 34. p. 391.

Herr Prof. *Fabrizius* zieht nun auch den *Attelabus purpureus* Ent. Syst. und wie auch ich glaube, mit Recht hieher. Ueber den Aufenthaltsort dieses Käfers sind die Meinungen verschieden. Einige haben ihn *immer nur* auf grünen Gewächsen, (auf Aegopod. Podagrar. L. Payk. Fn. Succ. III. p. 177.) vorzüglich in nassen Gräben auf dem Ampfer angetroffen (f. A. L. Z. 1797. Nr. 39. p. 306.) Herr Prof. *Fabrizius* wiederholt, das schon von *Linné*, *habitat in frumento diutius asservato* gesagte, hier abermals, und da *Linné* noch hinzusetzt, *peissimus*, so muß er doch als ein dem Getreyde schädliches Insekt anerkannt werden. Möglich, daß man ihn auch anderswo als nur auf Kornspeichern findet, so wie ich mehrmals *Calandra granaria* F. auch an Orten antraf, wo gewis nie Kornspeicher waren, welche beyde Fälle vielleicht nur durch Zufall veranlaßt worden sind.

ATTE-

ATTELAEVS INTERMEDIVS. Fn. Inf. germ. XXI. 22.

Ist eine eigene deutlich verschiedene Art.

CYRCVLIO PINI. Fn. Inf. germ. XLII. 1.

Rynchaenus Pini. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 7.
p. 440.

Vergl. *Herbst*. Naturg. d. Käf. VI. p. 147.

CYRCVLIO LINARIAE. Fn. Inf. germ. XXVI. 18.
ed. I.

Rhynchaenus teter. Fn. Inf. germ. XXVI. 18.
ed. II.

Rhynchaenus teter. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 50. p. 448.

Ich zweifle indess sehr an dieser Bestimmung, und es ist möglich, dafs *Fabrizius* sich durch diese unnatürlich schwarze Illumination, dieser Figur getäuscht habe. Außerdem wird wohl schwerlich der *R. teter* F., schon wegen der sehr abweichenden Gröfse (Statura et magnitudo C. Campanulae) hier in Vergleich kommen können. Der *Rhynch. Campanulae* F., den einige irrig mit dem *C. linariae* Fn. vereinigen, ist ein viel kleinerer Käfer, (Linné sagt *magnitud. pediculi*, aber das ist gar zu arg, er ist doch gröfser) der ganz von dem unserigen abweicht: richtiger ist folgende Bestimmung:

CYR-

CVRCVLIO LINAR. Fn. l. c.

Rhynchaenus Aiugae. Illiger.

Rhynchaenus Aiugae. Herbst. Nat. d. Käf. VI.
172. 132.

Von seinem wahrscheinlich gewöhnlichen Aufenthaltsorte, in den gallenförmigen Auswüchsen der Wurzeln, des *Antirrhin. Linaria Linn.*, ob man gleich nicht alle Jahre, und nicht an jedem Antirrh. Linar. L. diesen Käfer findet, entlehnte ich, nach der Beobachtung des Herrn Schnitzlein, den Beynahmen für denselben. Dafs er auch auf einer *Aiuga* angetroffen werden könne, ist möglich, und eben darum finde ich diesen neuen Beynamen nicht unpaffend. Aber weder die *Linaria* noch eine von den *Aiugis* sind die ausschliesslichen Aufenthaltsorte dieses Käfers. Eben dieser *Curcul. linariae* Fn. zerstörte mir heuer das *Verbascum Boerhaavi* L. im Garten zugleich mit *Rhynch. Scrophul.* und *Thapsus* so sehr, dafs, wenn ich nicht täglich solche in grosser Anzahl abgefangen hätte, die ganze schöne vier Schuh hohe Pflanze, gewis von demselben, völlig zu Grunde gerichtet worden wäre.

CVRCVLIO AFFINIS. Fn. Inf. germ. LVII. 15.

Rhynchaenus Alauda. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 82. p. 454.

CVRCVLIO DORSALIS. Faun. Inf. germ. XVII. 9.

Rhynchaenus dorsalis. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 83. p. 454.

Hierher gehört auch *Curculio dorsalis* Paykull
Fn. Suec. III. n. 17. p. 200. nicht aber *Curculio*
dorsalis Linn. der nach der Fn. Suec. eine ganz
andere Art feyn muß.

CVRCVLIO ARTEMISIAE. Fn. Inf. germ. XVIII.
10.

Rhynchaenus Artemisiae. Fabric. Syft. Eleuth.
II. n. 92. p. 456.

Curculio Artemisiae. Herbst. Nat. d. Käf. VI.
tab. 66. fig. 5.

CVRCVLIO LAPATHI. Fn. Inf. germ. XLII. 15.

Rhynchaenus Lappathi. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 140. p. 466.

Nicht nur auf den Ampfer- und Weidenarten
hält fich diefer Käfer auf, er ift auch in manchen
Jahrgängen für die Erlen (*Betula Alnus* Linn.)
ein fehr fchädliches Infekt.

CVRCVLIO ACETOSAE. Fn. Inf. germ. XLII. 9.

Rhynchaenus Rumicis. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 93. p. 436.

CVRCVLIO PORCATVS. Fn. Inf. germ. LVII. 16.

Rhynchaenus porculus. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 144. p. 467.

CVR-

CYRCVLIO SALICIS. Faun. Inf. germ. XVIII. 15.

Rhynchaenus Crux. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 87. p. 455.

CYRCVLIO JOTA. Fn. Inf. germ. XVIII. 16.

Ist nichts anders als ein verwischtes Exemplar
des vorhergehenden.

CYRCVLIO PARALLELVS. Fn. Inf. germ. XVIII. 5.

Rhynchaenus venustus. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 90. p. 456.

CYRCVLIO QVADRIDENS. Fn. Inf. germ. XXXVI.
13.

Rhynchaenus Calcar. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 261. p. 493.

CYRCVLIO VIDVVS. Fn. Inf. germ. XLII. 17.

Rhynchaenus didymus. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 209. p. 482.

CYRCVLIO PECTORALIS. Fn. Inf. germ. XXXVI.
16.

Rhynchaenus pectoralis. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 246. p. 490.

CYRCVLIO FLAVIPES. Fn. Inf. germ. LXII. 11.

Rhynchaenus flavipes. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 247. p. 490.

CYR-

CYRCVLIO PVSIQ. Fn. Inf. germ. XXXVI. 15.

Die Flügeldeckennaht ist *schwarz*, wie ich es auch in meiner Beschreibung anzeigte. Eine neue sehr distinkte Art.

CYRCVLIO ARCVATVS. Fn. Inf. germ. XVIII. 6.

Rhynchaenus arcuatus. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 248. p. 490?

Ob gleich Herr Prof. *Fabrizius* a. a. O. die Fn. Inf. wenn gleich, *wie es scheint*, mit nicht vergleichener Abbildung daselbst, anführt, so scheint der Beschreibung nach doch der *Fabrizische arcuatus* ein, von dem meinigen sehr verschiedener Käfer zu seyn. *Fabrizius* sagt, *pallidus*, und spricht von *elytris cinerascens*. Das trifft auf den meinigen nicht zu. Eben wegen seiner *gelbsüchtigen* Farbe, nannte ich den meinigen *arcuatus*, weil auch *morbus arcuatus*, als Synonym von *Icterus* vorkommt. Das übrige sagt meine Beschreibung.

CYRCVLIO INCVRVVS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 17.

Rhynchaenus Pomorum. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 250. p. 491.

CYRCVLIO BICOLOR. Fn. Inf. germ. XVIII. 4.

Lixus bicolor.

Ist eine eigene nun unter *Lixus* bestimmt gehörige Art.

CURCULIO APSINTHII. Fn. Inf. germ. XVIII, 9.

Rhynchaenus nigrinus. Illig.

Curculio nigrinus. Herbst. Nat. d. Käf. VI.
n. 20. p. 60. tab. 62. fig. 16.

Vielleicht, schrieb mir Herr D. Illiger hierüber,
Lixus Atriplicis Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 31.
p. 504. wo die Citate aus Linné und Paykull weg-
zustreichen sind. —

Dieser Curcul. Apfenth. Fn. ist dem Curc. Ar-
temis. Fn. 18. 10. überaus ähnlich, und ein Rhyn-
chaenus wie dieser, und gewis kein Lixus.

CURCULIO CHLORIS. Fn. Inf. germ. XVIII.

Rhynchaenus Chloris. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 39. p. 446.

Hieher gehört auch: *Curculio caerulefcens*
Schränk. inf. austr. n. 202. folglich auch Fn. boic. I.
n. 525. und Scop. carn. n. 87. und zwar nach A.
L. Z. 1796. n. 97. Doch kan ich das von meinem
Käfer nicht sagen, was Schränk u. Scopoli: auch
trifft das angegebene Größenmaafs beider nicht zu.

CURCULIO QUADRINOTATUS. Fn. Inf. germ. LVII.
12.

Rhynchaenus Hercyniae. Illig.

Curculio Hercyniae Herbst. Nat. d. Käf. VI.
n. 265. p. 294. tab. 82. fig. 11.

aber

aber auf keine Weise *Curcul. Talbum* Linn. Payk.,
der mit *Curcul. funereus* Herbst. l. c. nr. 122. ei-
nerley ist. Illiger.

CVRCVLIO BRVNEVS. Fn. Inf. germ. XXVI. 17.

Eine sehr deutlich sich kennbar machende Art.

CVRCVLIO HORRIDVS. Fn. Inf. germ. LXXXIV. 9.

Eine wohl unterschiedene Art, auch am Rhein
und bey Göttingen gefunden. *Rhynchaenus hispi-*
us nobis, olim. Illiger. Herr Apotheker Funk
in Gfrees bey Bayreuth hat auch diesen Käfer auf
dem Fichtelberg entdeckt.

CVRCVLIO DESERTVS. Fn. Inf. germ. XLII. 8.

Hat große Aehnlichkeit mit *Rhynchaenus tri-*
guttatus Fabric. ich kan iedoch, weil ich ihn
nicht mehr besize, nicht hierüber entscheiden.

CVRCVLIO OPHTHALMICVS. Fn. Inf. germ. LVII.
15.

Curculio distinctus. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 56. p. 516.

CVRCVLIO GLAVCVS. Fn. Inf. germ. XIX. 6.

Curculio obliquus. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 58. p. 516.

Der hier vorgestellte *C. glaucus*, ist weder der
gleichnamige des *Fabricius*, noch der *Curculio*
nebulosus desselben, noch weniger dessen Abän-
derung.

CYRCVLIS DERASVS. Fn. Inf. germ. LVII. 11.

Hat groſſe Aehnlichkeit mit Curcul. binotar. Fabric. Syſt. Eleuth. II. n. 190. der mancherley Spielarten hat, aber ſtets mit ſtumpfen Schenkelzähnen vorkommt. Illiger.

Indeſſen weicht die Beſchreibung doch ſehr ab, der zu Folge ein punctum parvum diſtinctum verſus apicem elytrorum präſendirt wird, das nicht zugegen iſt, vielmehr andere charakteriſtiſche Eigenheiten zugegen ſind, deren nicht gedacht worden. Ich beſitze dieſen Käſer nicht.

CYRCVLIO FRITILLVM. Fn. Inf. germ. XVIII. 19.

Curculio Fritillum. Fabric. Syſt. Eleuth. II. n. 81. p. 521.

CYRCVLIO MEGERLEI. Fn. Inf. germ. LXXXVII. 7.

Curculio Megerlei. Fabric. Syſt. Eleuth. II. n. 84. p. 521.

Die Abbildung in der Fn. Inf. wurde nach dem nehmlichen Exemplar verfertigt, welches Herr von Megerle mir gefälligſt abgetreten hatte. Würde es ſich beſtätigen, daſs wenigſtens die meiſten Exemplare *femora dentata* hätten, ſo würde dieſer Curculio nicht mehr unter dieſer Abtheilung der wahren *Fabriziſchen Curculion.* ſtehen bleiben dürfen,

CVRCVLIO ENVCLEATOR. Faun. Inf. germ. LVII.
14.

Ich besitze diese Art nicht mehr, um hierüber
sicher zu bestimmen.

CVRCVLIO PABVLINVS. Fn. Inf. germ. LVII. 19.

*Einem eben entwickelten Curcul. ovatus Fabr. und
Linn. sehr ähnlich. Illiger.*

Ueberaus viel wahrscheinliches hat diese scharf-
sinnige Coniektur: ich besitze diesen Käfer nicht
mehr, um hierüber zu entscheiden.

CVRCVLIO CVPRIFER. Fn. Inf. germ. LXI. 10.

Auch diesen habe ich an Herrn von Megerle
wieder zurückgegeben; ich kenne ihn also nicht
mehr.

CVRCVLIO GRACILIPES. Fn. Inf. germ. LVII. 18.

*Dem Curc. ruficollis Fabr. ähnlich. Doch scheint
die Gestalt des Halschildes, und die Färbung der
Flügeldecken verschieden. Illiger.*

Auch diesen Käfer besitze ich nicht mehr.

CVRCVLIO DENTATUS. Fn. Inf. germ. LVII. 13.

Eine eigene Art.

CVRCVLIO CLOROPVS. Fn. Inf. germ. XIX. 14.

*Hylesinus cloropus. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 17. p. 393.*

Hierher gehört unstreitig:

CVR-

CYRCVLIO PLANIROSTRIS. Fn. Inf. germ. XVIII.
18.

und wie es scheint, nur als *Abänderung*.

COLYDIVM FASCIATVM. Fn. Inf. germ. XXXI. 22.
Dermestes elongatus. Linn. Syst. Nat. n. 2.
p. 561. Fn. Succ. n. 409.

HYPOPHLOEVS PINI. Fn. Inf. germ. LXVII. 19.
Hieher gehört als Synonym:
Hypophloeus ferrugineus. Creutz. Verf. p. 126.
Tab. III. fig. 30. a.

LYCTVS CYLINDRICVS. Fn. Inf. germ. XXXV. 18.
Ist nicht *Lyctus terebrans* Fabric. sondern eine
eigene verschiedene Art.

LYCTVS PUBESCENS. Fn. Inf. germ. VI. 17.
Auch eine eigene für sich bestehende Art.

LYCTVS DERMESTOIDES. Fn. Inf. germ. VIII. 15.
ed. I.
Ips ferruginea. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 17.
p. 580.

LYCTVS ABBREVIATVS. Fn. Inf. germ. XXIV. 21.
Nitidula sexpustulata. Fabric. Syst. Eleuth.
I. n.

Nicht als die wahre *N. sexpustul.* F. sondern
nur als *Abänderung* derselben, gehört dieser *Ly-*
ctus abbrev. Fn. hieher.

MYCE-

MYCETOPHAGVS PUNCTATVS. Fn. Inf. germ. XII.
12.

Ips punctata. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 13.
p. 579.

MYCETOPHAGVS BIFASCIATVS. Fn. Inf. germ. II.
24.

Ips bifasciata. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 14.
p. 579.

MYCETOPHAGVS FVLVICOLLIS. Faun. Inf. germ.
LXII. 4.

Mycetophagus fulvicollis. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 21. p. 569.

Die maculae elytrorum sind nicht rufae, sondern *flavae*, so wie solche auch *Payk*. Fn. Suec. III. n. 6. p. 325. anzeigte.

MYCETOPHAGVS SPINIPES. Fn. Inf. germ. XXIV.
20.

Mycetophagus castaneus. Fabric. Syst. Eleuth.
II. n. 25. p. 569.

MYCETOPHAGVS SIGNATVS. Fn. Inf. germ. LVII.
20.

Ips bifasciata. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 14.
p. 579.

Sey nur eine Abänderung der *Ips bifasciat*. F. nach der Bemerkung des Herrn D. *Illigers*.

MYCE-

MYCETOPHAGVS BRUNNEVS. Fn. Inf. germ. LVII.

21.

Vielleicht eine eigene Art. Ich besitze diesen Käfer nicht mehr.

TRITOMA DUBIA. Fn. Inf. germ. XXXIX. 22.

Anisotoma dubium. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 8, p. 78.

Ist nicht Trit. dub. Fabric. Diese gehört bekanntlich unter *Catops agilis*. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 565. wofelbst iedoch der *Ptomoph. agilis* Illig. auszustreichen.

TRITOMA PILOSA. Fn. Inf. germ. VII. 8.

Coccinella flavipes. Illig. Kug. Käf. Pr. I. n. 3. p. 413.

Gehört iedoch mit mehr Recht unter Tritoma, selbst mit Herrn D. Illigers Beystimmung.

TETRATOMA CINNAMOMEA. Fn. Inf. germ. XII. 15.

Anisotoma cinnamomeum. Illiger.

Ist den Fühlhörnern nach wohl unter Anisotoma zu rechnen, doch kaum der übrigen, für ein *Anisotoma*, unerwarteten Struktura nach, wie denn auch die gewis sehr auffallende Gröfse hier mit in Betracht kommt. Ob das *Sphaerid. ferrug.* Payk. Fn. Suec. I. n. 24. p. 72. hieher gehören könne, ist vielleicht kaum zu bezweifeln; es kommt zwar in dessen Beschreib. verschiedenes

vor, das auf gegenwärtigen Käfer nicht zutrifft; auch gedenkt folcher der sonderbar gestalteten Füße gar nicht, wiewohl es fast für gewis anzunehmen ist, dafs sich dieser Umstand nur also an dem andern Geschlecht bewähre.

TRITOMA CONNATA. Fn. Inf. germ. XXXVI. 18.

Tritoma connatum. Fabric. Syst. Eleuth. II, n. 9. p. 572.

Vergl. *Allgem. Lit. Zeit.* 1797. n. 143. p. 327.

SCAPHIDIVM SCUTELLATVM. Fn. Inf. germ. IV.

11.

Dermestes Urticae. Fabric. Syst. Eleuth. I. n. 44. p. 320.

SCAPHIDIVM AGARICINVM. Fn. Inf. germ. IV. 2.

Scaphidium agaricinum. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 576.

Dies in der Fn. Inf. a. a. O. abgebildete *Scaph. agaric.* ist ganz das nehmliche mit.

SCAPHIDIVM BOLETI. Fn. Inf. germ. XII. 16.

Denn dieses ist nur, ein nicht lange seinen Nymphenstand verlassen habendes Exemplar. Die Fühlhörner am *bolet.* sind ganz die nehmlichen wie am *agaricin.*, wenn sie gleich in der Abbildung verschieden sind.

Bey

Bey Scaph. agric. Fabr. muß in der Ent. Syst. I. der *Derm. hemipt. Panz. Naturforsch. &c.* wegfallen, der zum *Dermestes Urticae F.* gehört.

IPS NIGRIPENNIS. Fn. Inf. germ. L. 7.

Triplax nigripennis. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 1. p. 581.

IPS RVFIPES. Fn. Inf. germ. XIII. 17.

Triplax rufipes. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 2. p. 581.

IPS RVFIFRONS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 19.

Engis rufifrons. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 4. p. 583.

DIAPERIS VIOLACEA. Fn. Inf. germ. III. 18.

Diaperis violacea. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 3. p. 586.

Chrysomela dytiscoides. Roffi Fn. Etruf. I. n. 208. p. 83.

DIAPERIS BICOLOR. Fn. Inf. germ. XCIV. 9.

Diaperis bicolor. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 6. p. 586.

Schäffer Ic. Inf. ratisb. tab. 257. fig. 5. a. b.

Panzer system. Nomenclat. d. Schäf. Inf. n. 5. p. 207.

Ich lasse hier Herrn D. Illiger selbst sprechen:

Ihr *Scolytus aeneus* Fn. Inf. germ. VIII. 2. ist wohl unstreitig *Diaperis aenea* Fabric. aber auch dessen *Mycetophagus metallicus*, und vielleicht auch seine

seine *Galleruca Lactucae*. Eben so sicher ist ihre *Diaperis bicolor*. Fn. 94. 4. eine Spielart von ihr, und wenn sie überzeugt seyn können, daß ihr Käfer der *Fabrizische* ist, so muß auch dessen *Diaperis bicolor* hieher gezogen werden. So hellfarbig wie die Fn. im 94ten Hefte den Käfer vorstellt, habe ich ihn zwar noch nie gesehen; allein das Braunrothe schimmert auf dem Halschilde allemal durch. —

Mein *Scolytus aeneus* Fn. l. c. zeigt sehr deutlich ein dunkelbraunrothes Bruststück an, und dieses ist in der Abbildung übersehen worden. Die *Diaperis bicolor* Fn. l. c. ist durchaus ganz gewiß der nehmliche Käfer, nur mit ungleich hellerm braunrothen Bruststück. Demnach gehören beide Abbildungen nur unter eine Art. Ob ich aber die wahre *Diaperis bicolor Fabric.* hier vorstellig gemacht habe, das mögte dieselbnach wohl noch nicht entschieden seyn. *Fabrizius* Käfer scheint gar nichts metallartiges an sich zu haben, er sagt bloß sie sey, *atra*, und im Suppl. Ent. syst. p. 179. zeigt er *elytra laevia* (also nicht einmal *substriata*) an, und spricht von *pedibus anticis rufis*: wenn nun dies, die *Diaperis bicolor Fabr.* ganz ausschließend auszeichnende Charaktere sind, welche die standhafte Identität dieser Art bestimmen, so muß ich gestehen, daß solche meiner *Diap. bicolor.* keineswegs zukommen. Es mögte

mögte daher wohl gethan seyn, so lange, bis dieser Umstand näher in das Reine gebracht wird, beyde, meine *Diaperis bicolor* und *Scolytus aeneus* Fn. unter einer Art aufzuführen, die Paykull (Fn. Suec. n. 3. p. 359.) sehr gut unter *Diaperis aenea* charakterisirt hat. Dafs der *Mycetophagus metallicus* hieher gehöre, habe ich schon in meiner *system. Nomenclat. d. Sch. Inf.* geahndet.

MELOE TECTA. Fn. Inf. germ. X. 14.

Ist nur Abänderung von *Meloe Proscarabaeus* Linn. welche mit *Meloe punctata* Fab. et Fn. Inf. germ. X. 16. einerley ist. Die *Meloe Proscarabaeus* Fab. et Fn. X. 12. ist davon verschieden, und ist *Meloe violac.* Marsham. Illiger.

STAPHYLINUS CHLOROPTERUS. Faun. Inf. germ. XXXVI. 20.

Staphylinus chloropterus. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 5. p. 591.

Staphylinus chloropterus. Gravenh. coleopt. micropt. n. 15. p. 166.

STAPHYLINUS AENEOCEPHALUS. Fn. Inf. germ. XXVII. 5.

Staphylinus chalconcephalus. Fabr. Syst. Eleuth. II. n. 17. p. 593.

STAPHYLINUS FVLVIPES. Fn. Inf. germ. XXVII. 9.

Staphylinus ochraceus. Gravenhorst. coleopt. micropt. n. 65. p. 43.

STA-

STAPHYLINUS FUSCIPES. Fn. Inf. germ. XXVII. 12.

Tachinus sordidus. Gravenh. coleopt. micropt.
n. 8. p. 141.

STAPHYLINUS ANGVSTATVS. Fn. Inf. germ. XI. 18.

(non 34. 18, ut apud Fabric. Syft. Eleuth.)

Staphylinus angustatus. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 50. p. 599.

Paederus angustatus. Gravenh. coleopt. mi-
cropt. n. 7. p. 63.

STAPHYLINUS SANGVINEVS. Fn. Inf. germ. XI. 19.

Pselaphus sanguineus. Fabric. Syft. Eleuth. II.
n. 22. p. 293.

STAPHYLINUS BIGUTTATVS. Fn. Inf. germ. XI. 17.

Stenus biguttatus. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 1.
p. 602.

Stenus biguttatus. Gravenh. coleopt. micropt.
n. 2. p. 154.

STAPHYLINUS CLAVICORNIS. Fn. Inf. germ. XXVII.
11.

Stenus buphthalmus. Gravenh. coleopt. mi-
cropt. n. 6. p. 156.

STAPHYLINUS FLORALIS. Fn. Inf. germ. XI. 20.

Stenus floralis. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 6.
p. 604.

Omalium florale. Gravenh. coleopt. micropt.
n. 10. p. 118.

STA-

STAPHYLINUS PALLIDIPENNIS. Fn. Inf. germ. XXVII. 16.

Oxytelus morsitans. Gravenh. coleopt. micropt. n. 9. p. 108.

STAPHYLINUS CARINATUS. Fn. Inf. germ. LVII. 24.

Oxytelus carinatus. Gravenh. coleopt. micropt. n. 6. p. 106.

STAPHYLINUS ARMATUS. Fn. Inf. germ. LXVI. 17. Mas.

Oxytelus tricornis. Gravenh. coleopt. micropt. n. 11. p. 109.

STAPHYLINUS IMPRESSUS. Fn. Inf. germ. XXXVI. 21.

Staphylinus impressus. Gravenh. coleopt. micropt. n. 51. p. 35.

STAPHYLINUS LAMINATUS. Fn. Inf. germ. LXVII. 20.

Staphylinus laminatus. Gravenh. coleoph. micropt. n. 17. p. 16.

Staphylinus laminatus. Creutz. Verf. p. 128. tab. 3. fig. 31.

OXYPORUS LUNULATUS. Fn. Inf. germ. XXII. 15.

Staphylinus atricapillus. Fabric. Syst. Eleuth. II. n. 49. p. 599.

Tachinus atricapillus. Gravenh. coleoptr. micropt. n. 19. p. 148.

Oxy-

OXYPORVS MARGINELLVS. Fn. Inf. germ. IX. 13.

Tachinus humeralis. Gravenh. coleopt. micropt. n. 2. p. 136.

OXYPORVS MERDARIVS. Fn. Inf. germ. XXVII. 18.

Staphylinus merdarius. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 46. p. 598.

PAEDERVS ELONGATVS. Fn. Inf. germ. IX. 12.

Paederus elongatus. Fabric. Syft. Eleuth. II. n. 3. p. 609.

Lathrobium elongatum. Gravenh. coleopt. micropt. n. 8. p. 55.

PAEDERVS FVLVIFENNIS. Fn. Inf. germ. XXVII. 23.

Staphylin. ochrac. Var. Gravenh. coleopt. micropt. n. 65. p. 43.

PAEDERVS FVLGIDVS. Fn. Inf. germ. XLIII. 20.

Staphylinus fulminans. Gravenh. coleopt. micropt. n. 70. p. 47.

Nach Herrn D. Gravenhorst a. a. O. nicht der *Paederus fulgidus* Fabric.

PAEDERVS ORBICVLATVS. Fn. Inf. germ. XLIII. 21.

Paederus orbicularis. Gravenh. coleopt. micropt. n. 6. p. 63.

Nicht der *Paederus orbiculatus* Fabric. sondern *Paeder. orbicul. Payk.* Der eigentliche *Paederus orbicul. Fabric.* wird von Herrn D. Gravenhorst a. a. O. mit *Lathrobium fracticorne* n. 5. p. 54. vereinigt.

PAE-


PAEDERUS DIMIDIATUS. Fn. Inf. germ. XXVII. 24.

Staphylinus tenuis. Fabric. Syst. Eleuth. II.
n. 53. p. 599.


Staphylinus tenuis. Gravenh. coleopt. micropt.
n. 58. p. 39.

CLAVIGER TESTACEUS. Fn. Inf. germ. XLIX. 9.

Die Gattung *Claviger* ist sehr ausgezeichnet, und auffallend. Ich zweifle nicht daran, daß der *Clavig. testaceus* ein ausgebildetes Insekt seye. In der Kopfbildung ist er dem *Sarrotrium* sehr ähnlich. Ich habe wohl ein Duzend sich völlig gleicher Exemplare dieser merkwürdigen Preyslerischen Entdeckung vor mir gehabt. Die Leibringe sind allerdings vorhanden, aber in der Aftergegend, welche nach unten abfällt, zu suchen. Illiger.











SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00356341 8

nhent QL482.G2P19

Bdchn. Kritische Revision der Insektenfa